

DAFTAR PRODUK



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia



DAFTAR PRODUK



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

DAFTAR PRODUK



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

PT. Sampharindo Perdana

Factory

Jl. Tambak Aji Raya No. 8 Semarang

Sole Distributor

PT. Sampharindo Putra Trading

Jl. Tambak Aji I No. 15 Semarang

Edisi Juli 2025

V.7.25





MISI

MENYEDIAKAN OBAT BERMUTU SECARA NASIONAL
SESUAI KEBUTUHAN DAN POLA PENYAKIT
MASYARAKAT DENGAN HARGA TERJANGKAU

Halaman Judul	ii	Anti Alergi	
Sampharindo Grup	iii	Alerzin 10 Tablet Salut	23
VISI & MISI	iv	Alerzin Sirup	24
DAFTAR ISI	v	Kofiren Tablet	25
		Miratadin Kaplet	26
		Miratadin Sirup	27
ANTI INFEKSI		KARDIOVASKULER	
Penisilin		Anti Hipertensi	
Brodamox 500 Kaplet	2	Bisophar 5 Tablet Salut Selaput	29
Brodamox 250 Suspensi Kering	3	Cardipin 10 Kaplet	30
Brodamox 125 Suspensi Kering	4	Cardipin 5 Kaplet	31
Brodapen 500 Kaplet	5	Cortavas 20 Tablet Salut Selaput	32
Brodapen 125 Suspensi Kering	6	Cortavas 10 Tablet Salut Selaput	33
Quinolone		Tensifor 16 Tablet	34
Miraflox 500 Kaplet	7	Tensifor 8 Tablet	35
Cotrimoxazole		SUPLEMEN	
Miratrim Forte Kaplet	8	Multivitamin Dewasa	
Miratrim Tablet	9	Berovit-CE Kapsul	37
Miratrim Suspensi	10	Bionicom-C Kaplet Salut Selaput	38
Anti Virus		Bionicom-C 500 Kaplet Salut Selaput	39
Samclovir 400 Tablet	11	Bionicom-C 500 Amplop Kaplet Salut	40
HEMATOLOGI		Bionicom Zinc Kaplet Salut Selaput	41
Anti Anemia		Bionicom Zinc Amplop Kaplet Salut	42
Mirabion	12	Calcix-D Kaplet	43
Siobion	13	Calkomir 500 Kaplet	44
IMUNOLOGI		Miraneuro Tablet	45
Anti Alergi & Kortikosteroid		Samce 500 Kaplet	46
Mexon Kaplet	15	Vitace 1000 Vitamin D3	47
Mexon Sirup	16	Multivitamin Anak	
Mexon Beta Kaplet	17	Bionick Mild Sirup	48
Mexon Beta Sirup	18	Vitabiol Sirup	49
Kortikosteroid		SALURAN CERNA	
Carbidu 0,75 Tablet	19	Anti Emitik	
Carbidu 0,5 Tablet	20	Mantino 50 Tablet	51
Carmeson 8 Tablet	21	Miradon Tablet	52
Carmeson 4 Tablet	22	Miradon Sirup	53

Primpen Tablet	54
Primpen Sirup	55

Anti Diare

Primodiar 2 Tablet	56
--------------------	----

Anti Maag

Carsida Tablet	57
Carsida Suspensi	58

SALURAN NAFAS

Anti Influenza

Coparcetin Kaplet	60
Coparcetin Sirup	61
Coparcetin Orange Sirup	62
Coparcetin Kid Cough Sirup	63
Finos Sirup	64
Fluanza Kaplet	65
Fluanza Sirup	66
Milsen Sirup	67

Ekspetoran & Mukolitik

Guamin Sirup	68
Miradryl Sirup	69
Mirapect Tablet	70
Mirapect Sirup	71
Miravon Tablet	72
Miravon Sirup	73
OBH Sekar Sirup	74

Anti Asma

Alstein 200 Kapsul	75
Proast Sirup	76

SISTEM SARAF

Anti Piretik

Mirasic Plus Kaplet	78
Mirasic Forte Kaplet	79
Mirasic Kaplet	80
Mirasic Sirup	81

Anti Gout

Purinic 300 Tablet	82
Purinic 100 Tablet	83

Analgetik NSAID

Axaprofen Kaplet	84
Axofen Suspensi	85
Caranal Forte	86
Cargesik 500 Kaplet	87
Miracloven Tablet	88
Miradene 20 Kapsul	89
Oxcam 15 Tablet	90
Retrofen Kapsul	91

TOPIKAL KULIT

Mikazol Krim 2%	93
Miracort Krim 2,5%	94
Samklovir Krim 5%	95
Valbeson-N Krim	96

DAFTAR OBAT GENERIK BERLOGO

97

DAFTAR DISTRIBUTOR

98

CATATAN

102



ANTI **INFEKSI**



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Broadamox 500

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Amoxicillin Trihydrate 500 mg

INDIKASI :

- Infeksi saluran pernafasan saluran bawah,
 - Infeksi kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh Stafilokokus, Stafilokokus, dan Escherichia coli.
 - Infeksi saluran pencernaan seperti diare akibat bakteri, shigelosis, salmonellosis.
 - Infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh Escherichia coli, Proteus mirabilis dan Steptococcus faecalis.
 - Gonore
- Profilaksis endokarditis pada tindakan untuk gigi.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang peka terhadap penisillina dan sefalosporin.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak lebih 20kg :
3 kali 250 - 500 mg / hari
Anak-anak dibawah 20kg :
20 - 40 mg / hari dibagi dalam 3 dosis tiap 8 jam.

NIE : DKL 9623404504 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam purnama perdana
Semarang - Indonesia

Broadamox[®]

Suspensi Kering



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Amoxicillin Trihydrate 250 mg

INDIKASI :

- Infeksi saluran pernafasan saluran bawah,
 - Infeksi kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh Stafilokokus, Stafilokokus, dan Escherichia coli.
 - Infeksi saluran pencernaan seperti diare akibat bakteri, shigelosis, salmonelosis.
 - Infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh Escherichia coli, Proteus mirabilis dan Steptococcus faecalis.
 - Gonore
- Profilaksis endokarditis pada tindakan untuk gigi.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang peka terhadap penisillina dan sefalosporin.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak lebih 20kg :
3 kali 150 - 500 mg tiap 8 jam
Anak-anak dibawah 20kg :
20 - 40 mg / hari dibagi dalam 3 dosis tiap 8 jam

NIE : DKL 0823411438 B1



Sole Distributor :



sam purnama
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Broadamox[®]

Suspensi Kering



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Amoxicillin Trihydrate 125 mg



INDIKASI :

- Infeksi saluran pernafasan saluran bawah,
 - Infeksi kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh Stafilokokus, Stafilokokus, dan Escherichia coli.
 - Infeksi saluran pencernaan seperti diare akibat bakteri, shigelosis, salmonelosis.
 - Infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh Escherichia coli, Proteus mirabilis dan Steptococcus faecalis.
 - Gonore
- Profilaksis endokarditis pada tindakan untuk gigi.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang peka terhadap penisillina dan sefalosporin.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak lebih 20kg :
3 kali 150 - 500 mg tiap 8 jam
Anak-anak dibawah 20kg :
20 - 40 mg / hari dibagi dalam 3 dosis tiap 8 jam

NIE : DKL 0823411438 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Broadapen 500

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Ampicillin Trihydrate 125 mg

INDIKASI :

- Infeksi saluran pencernaan, bronkhipneumonia, otitis media.
- Infeksi saluran kemih seperti pielonefritis akut dan kronik.
- Gonore yang tidak terkomplikasi.
- Infeksi alat kelamin wanita, pelvis kecil seperti aborsiseptis, adnaksitis, endometritis, parametritis, perviperitonitis, demam puerperal.

KONTRA INDIKASI :

- Pada pasien yang hipersensitif terhadap penicillin dan turunannya.
- Pada infeksi yang disebabkan oleh kuman penghasil enzim Penicillase.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak lebih 20kg :

4 kali 250 - 500 mg per hari

Anak-anak dibawah 20kg :

50 - 100 mg per hari dibagi dalam 4 dosis tiap 6 jam

NIE : DKL 9623404404 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Broadapen[®]

Suspensi Kering



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Ampicillin Trihydrate 125 mg

INDIKASI :

- Infeksi saluran pencernaan, bronkhipneumonia, otitis media.
- Infeksi saluran kemih seperti pielonefritis akut dan kronik.
- Gonore yang tidak terkomplikasi.
- Infeksi alat kelamin wanita, pelvis kecil seperti aborsiseptis, adnaksitis, endometritis, parametritis, perviperitonitis, demam puerperal.
- Infeksi saluran pencernaan.

KONTRA INDIKASI :

- Pada pasien yang hipersensitif terhadap penicillin dan turunannya.
- Pada infeksi yang disebabkan oleh kuman penghasil enzim Penicillase.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak lebih 20kg :

4 kali 250 - 500 mg per hari

Anak-anak dibawah 20kg :

50 - 100 mg per hari dibagi dalam 4 dosis tiap 6 jam

NIE : DKL 0823411538 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading

Miraflox[®] 500

Kaplet salut



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Ciprofloxacin Hcl setara dengan 500 mg
Ciprofloxacin

INDIKASI :

- Saluran kemih, termasuk prostatitis.
- Uretritis dan servisitis gonore.
- Saluran cerna, termasuk demam tifoid.
- Saluran nafas, kecuali pneumonia oleh streptokokus.
- Kulit dan jaringan lunak.
- Tulang dan sendi.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang peka terhadap ciprofloxacin.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Anak-anak dibawah usia 12 tahun.

KEMASAN :

10 strip @ 10 kaplet salut

DOSIS :

Dewasa :

- saluran nafas, tulang, sendi, kulit & jaringan lunak :
2 x 1 - 1 ½ kaplet salut.
- Saluran kemih : sehari 2 x ½ - 1 kaplet salut.
- Infeksi pada saluran cerna : sehari 2 x 1 kaplet salut.
- Infeksi gonore akut : dosis tunggal ½ kaplet salut.

NIE : DKL 9323403409 A1



Sole Distributor :



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miratrim Forte® Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :

Sulfamethoxazole	800 mg
Trimetoprim	160 mg

INDIKASI :

- Infeksi Traktus urinarius seperti Pielonefritis, Pielitis dan Prostat akut dan kronis yang disebabkan oleh kuman yang sensitif seperti E.coli, Klebsiella, Enterobacter dan Proteus mirabilis.
- Infeksi Traktus gastrointestinal, terutama yang disebabkan oleh kuman Salmonella dan Shigella seperti demam Tifoid, Paratifoid dan Disentri basiler.
- Infeksi Traktus respiratorius seperti bronchitis dan akut.
- Infeksi THT seperti Otitis Media akut dan Sinusitis akut.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita sensitif terhadap golongan Sulfonamida atau Trimetoprim.
- Bayi berumur kurang dari 2 bulan.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Penderita Anemia megaloblastik.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

- Dewasa & Anak-anak diatas 12 th : 2 x sehari 2 tablet
- Infeksi berat : 2 x sehari 3 tablet

NIE : DKL 9223402304 A2



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miratrim[®] Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Sulfamethoxazole 400 mg
Trimetoprim 80 mg



INDIKASI :

- Infeksi Traktus urinarius seperti Pielonefritis, Pielitis dan Prostat akut dan kronis yang disebabkan oleh kuman yang sensitif seperti E.coli, Klebsiella, Enterobacter dan Proteus mirabilis.
- Infeksi Traktus gastrointestinal, terutama yang disebabkan oleh kuman Salmonella dan Shigella seperti demam Tifoid, Paratifoid dan Disentri basiler.
- Infeksi Traktus respiratorius seperti bronchitis dan akut.
- Infeksi THT seperti Otitis Media akut dan Sinusitis akut.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita sensitif terhadap golongan Sulfonamida atau Trimetoprim.
- Bayi berumur kurang dari 2 bulan.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Penderita Anemia megaloblastik.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

- Dewasa & Anak-anak diatas 12 th : 2 x sehari 2 tablet
- Infeksi berat : 2 x sehari 3 tablet

NIE : DKL 9223402310 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miratrim[®]

Suspensi



KOMPOSISI :

Tiap 5 ml suspensi mengandung :
Sulfamethoxazole 200 mg
Trimetoprim 40 mg



INDIKASI :

- Infeksi Traktus urinarius seperti Pielonefritis, Pielitis dan Prostat akut dan kronis yang disebabkan oleh kuman yang sensitif seperti E.coli, Klebsiella, Enterobacter dan Proteus mirabilis.
- Infeksi Traktus gastrointestinal, terutama yang disebabkan oleh kuman Salmonella dan Shigella seperti demam Tifoid, Paratifoid dan Disentri basiler.
- Infeksi Traktus respiratorius seperti bronchitis dan akut.
- Infeksi THT seperti Otitis Media akut dan Sinusitis akut.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita sensitif terhadap golongan Sulfonamida atau Trimetoprim.
- Bayi berumur kurang dari 2 bulan.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Penderita Anemia megaloblastik.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

2 x sehari 1-2 sendok takar @ 5 ml

NIE : DKL 9323402433 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Samclovir[®] Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung Acyclovir 400 mg

INDIKASI :

Untuk pengobatan infeksi virus herpes simpleks tipe 1 dan tipe 2 serta virus Varicella zoster. Kemampuan melawan virus ini disebabkan perubahan intraselular dari Aciclovir oleh Timidin kinase.

KONTRA INDIKASI :

Pasien yang bersifat hipersensitif terhadap aciclovir.

KEMASAN :

Box, 5 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Herpes simpleks : 200 mg 2x sehari dengan interval 12 jam

Herpes zoster & Varicella : 800 mg 2x sehari dengan interval 12 jam



NIE : DKL 0823410310 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading

The background is a light blue gradient with a complex network of thin white lines connecting various nodes. Some nodes are represented by hexagons, others by circles, and some by larger, more complex geometric shapes. The overall aesthetic is scientific and technological.

HEMATOLOGI



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pindo perdana
Semarang - Indonesia

Mirabion®

Vitamin & Mineral
kapsul



KOMPOSISI :

Tiap kapsul mengandung :

Ferrous (II) Gluconate	250,0	mg
Manganese (II) Sulfate	0,2	mg
Copper (II) Sulfate	0,2	mg
Ascorbic Acid	50,0	mg
Folic Acid	0,4	mg
Cyanocobalamin	6,0	mcg



KEGUNAAN :

Membantu memenuhi kebutuhan Vitamin A, Vitamin C dan Vitamin E.

INDIKASI :

Untuk mencegah dan mengobati anemia, kekurangan Vitamin C, Vitamin B12, Asam Folat.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kapsul

DOSIS :

Dewasa : Sehari, 1 kapsul
diberikan pada waktu makan atau sesudah makan.

NIE : DBL 922 340 2101 A1

EFEK SAMPING :

Mual dan muntah

PERINGATAN & PERHATIAN :

Warna faeces dapat menjadi hitam.

Sole Distributor :



sam pindo perdana
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Siobion[®]

Vitamin & Mineral kapsul




KOMPOSISI :

Tiap kapsul mengandung :

			%AKG
Ferrous Fumarate	90,0	mg	135
Folic Acid	0,8	mg	-
Cyanocobalamin (B12)	15,0	mcg	625
Calcium Carbonate	200,0	mg	-
Colecalciferol (Vitamin D)	400,0	UI	65
Ascorbic Acid (Vitamin C)	75,0	mg	-

*% AKG berdasarkan pada diet 2150 kkal.



Siobion mengandung zat besi yang berperan dalam membantu pembentukan sel darah merah.

KEGUNAAN :

Membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada keadaan anemia karena kekurangan zat besi.

INDIKASI :

Untuk mencegah dan mengobati anemia, defisiensi Vitamin C dan Vitamin D serta Kalsium terutama pada masa kehamilan dan menyusui.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kapsul

DOSIS :

Dewasa : Sehari, 1 kapsul

NIE : POM SD 223013941

EFEK SAMPING :

Fases berwarna hitam.

Jangan diberikan pada pasien yang mengalami transfusi darah berulang atau anemia yang bukan dikarenakan kekurangan zat besi.

Sole Distributor :



sam pharindo perdana
putra trading

The background is a light blue gradient with faint, stylized molecular structures and a network of lines. In the center, there is a blurred image of a laboratory setting with a person working at a bench.

IMUNOLOGI



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mexon[®] Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :

Dexamethasone	0,5 mg
Dexchlorpheniramine	2,0 mg

INDIKASI :

Direkomendasikan dalam pengobatan kasus alergi pernapasan, dermatologis dan okular, serta gangguan peradangan mata, dimana terapi tambahan kortikosteroid sistemik diindikasikan.

KONTRA INDIKASI :

- Pasien dengan infeksi jamur sistemik,
- Bayi baru lahir dan prematur,
- Pasien yang mengenai terapi MAO inhibitor,
- Pasien yang menunjukkan reaksi hipersensitivitas pada komponen produk ini atau obat dari struktur kimia yang serupa.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

- Dewasa : 3 x sehari 1 kaplet
- Anak-anak : 3 x sehari 1 kaplet

NIE : DKL 0323406004 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mexon® Sirup



KOMPOSISI :

Tiap 5 ml sirup mengandung :
Dexamethasone 0,5 mg
Dexchlorpheniramine 2,0 mg



INDIKASI :

Untuk mengatasi reaksi alergi yang disertai peradangan atau pada keadaan dimana diperlukan terapi dengan kortikosteroid.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang hipersensitivitas terhadap Dexchlorpheniramine maleate.
- Penderita tukak lambung dan duodenum, anastomosis usus yang baru, herpes simplex pada mata, osteoporosis, infeksi fungsi sistemik, diabetes melitus, hipertensi berat.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

- Dewasa : 3 sendok takar setiap 4 - 6 jam sehari
- Anak-anak : 3 - 4 kali sehari 1/2 sendok takar

NIE : DKL1823414837 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mexon Beta

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Betamethasone 0,25 mg
Dexchlorpheniramine 2,00 mg

INDIKASI :

Direkomendasikan dalam pengobatan kasus alergi pernapasan, dermatologis dan okular, serta gangguan peradangan mata, dimana terapi tambahan kortikosteroid sistemik diindikasikan.

KONTRA INDIKASI :

- Pasien dengan infeksi jamur sistemik,
- Bayi baru lahir dan prematur,
- Pasien yang mengenai terapi MAO inhibitor,
- Pasien yang menunjukkan reaksi hipersensitivitas pada komponen produk ini atau obat dari struktur kimia yang serupa.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

- Dewasa : 1 - 2 kaplet setiap 4 x sehari setelah makan
 - Anak-anak : usia 12 th 1 - 2 kaplet setiap 4 x sehari setelah makan
- dosisnya tidak melebihi 8 kaplet per hari. Pada anak-anak dosis harus disesuaikan dengan keparahan kondisi dan respon pasien bukan berdasarkan usia atau berat badan.

NIE : DKL2223416404 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mexon Beta

Sirup



KOMPOSISI :

Tiap 5 ml sirup mengandung :
Betamethasone 0,25 mg
Dexchlorpheniramine 2,00 mg



INDIKASI :

Direkomendasikan dalam pengobatan kasus alergi pernapasan, dermatologis dan okular, serta gangguan peradangan mata, dimana terapi tambahan kortikosteroid sistemik diindikasikan.

KONTRA INDIKASI :

- Pasien dengan infeksi jamur sistemik,
- Bayi baru lahir dan prematur,
- Pasien yang mengenai terapi MAO inhibitor,
- Pasien yang menunjukkan reaksi hipersensitivitas pada komponen produk ini atau obat dari struktur kimia yang serupa.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

- Dewasa : 1 - 2 sendok takar setiap 4 x sehari
- Anak-anak : 1/2 sendok takar setiap 3 x sehari

NIE : DKL2123415937 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam phatindo perdana
Semarang - Indonesia

Carbidu® 0,75 Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Dexamethasone

0,75 mg



INDIKASI :

Untuk mengatasi gejala inflamasi akut, penyakit alergi, kolagen :
keadaan darurat seperti status asmatikus, reaksi anafilaksis
insufisiensi adrenal, edema serebal.

KONTRA INDIKASI :

Tukak lambung aktif, glaukoma, psikosis, psikoneurosis berat,
infeksi bakteri akut, penderita TBC aktif, herpes zoster, herpes
simplex, infeksi virus lain, infeksi fungsi sistemik, sindroma Cushing
dan penderita dengan gangguan fungsi ginjal.

KEMASAN : Box, 20 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Secara umum digunakan pemakaian :

- Dewasa : Sehari 1 - 6 tablet dibagi dalam 2 - 4 dosis

NIE : DKL 9523403910 B1

Sole Distributor :




sam phatindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Carbidu® 0,5 Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Dexamethasone

0,5 mg



INDIKASI :

Untuk mengatasi gejala inflamasi akut, penyakit alergi, kolagen : keadaan darurat seperti status asmatikus, reaksi anafilaksis, insufisiensi adrenal, edema serebal.

KONTRA INDIKASI :

Tukak lambung aktif, glaukoma, psikosis, psikoneurosis berat, infeksi bakteri akut, penderita TBC aktif, herpes zoster, herpes simplex, infeksi virus lain, infeksi fungsi sistemik, sindroma Cushing dan penderita dengan gangguan fungsi ginjal.

DOSIS :

Secara umum digunakan pemakaian :

- Dewasa : Sehari 1 - 9 tablet dibagi dalam 2 - 4 dosis

KEMASAN : Box, 20 strip @ 10 tablet

NIE : DKL 9423403910 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putratrading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pindo perdana
Semarang - Indonesia

Carmeson[®] 8 Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Methylprednisolone

8 mg

INDIKASI :

Penyakit kolagen, berbagai penyakit alergi dan autoimun, radang mata akut dan kronik, penyakit leukemia limfositik kronik dan akut, limfoma, multipel mieloma, kolitis ulseratif dan enteritis regional, kelainan hematologik, kelainan endoktrin tertentu, penyakit reumatik.

KONTRA INDIKASI :

Penyakit kolagen, berbagai penyakit alergi dan autoimun, radang mata akut dan kronik, penyakit leukemia limfositik kronik dan akut, limfoma, multipel mieloma, kolitis ulseratif dan enteritis regional, kelainan hematologik, kelainan endoktrin tertentu, penyakit reumatik.

KEMASAN : Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal Carmeson bervariasi dari 4 - 48 mg/hari (tergantung dari jenis dan beratnya penyakit serta respon penderita). Bila telah diperoleh efek terapi yang memuaskan, dosis ini dapat diturunkan sampai dosis efektif minimal untuk pemeliharaan.

NIE : DKL 0623409504 A1



Sole Distributor :



sam pindo perdana
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
samphar indo perdana
Semarang - Indonesia

Carmeson® 4

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Methylprednisolone

4 mg

INDIKASI :

Penyakit kolagen, berbagai penyakit alergi dan autoimun, radang mata akut dan kronik, penyakit leukemia limfostik kronik dan akut, limfoma, multipel mieloma, kolitis ulseratif dan enteritis regional, kelainan hematologik, kelainan endoktrin tertentu, penyakit reumatik.

KONTRA INDIKASI :

Penyakit kolagen, berbagai penyakit alergi dan autoimun, radang mata akut dan kronik, penyakit leukemia limfostik kronik dan akut, limfoma, multipel mieloma, kolitis ulseratif dan enteritis regional, kelainan hematologik, kelainan endoktrin tertentu, penyakit reumatik.

KEMASAN : Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal Carmeson bervariasi dari 4 - 48 mg/hari (tergantung dari jenis dan beratnya penyakit serta respon penderita). Bila telah diperoleh efek terapi yang memuaskan, dosis ini dapat diturunkan sampai dosis efektif minimal untuk pemeliharaan.

NIE : DKL 9523403910 B1



Sole Distributor :



samphar indo perdana
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Alerzin 10

Tablet Salut Selaput



KOMPOSISI :
Cetirizine Hydrochloride 10 mg

INDIKASI :

Cetirizine hydrochloride diindikasikan untuk mengobati perennial rhinitis, alergi rhinitis dan urtikaria idiopatik kronis.

KONTRA INDIKASI :

- Karena kurangnya data klinis, Cetirizine jangan digunakan selama trimester pertama kehamilan atau saat menyusui.
- Penyakit ginjal berat.
- Hipersensitivitas terhadap Cetirizine Hydrochloride.

KEMASAN :

Box, 10 amplop @ 1 strip @ 10 tablet salut selaput

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak diatas 12 tahun :
1 tablet x sehari

NIE : DKL 1923415417 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putratrading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Alerzin®
Sirup



KOMPOSISI :

Cetirizine Hydrochloride 5 mg

INDIKASI :

Cetirizine hydrochloride diindikasikan untuk mengobati perennial rhinitis, alergi rhinitis dan urtikaria idiopatik kronis.

KONTRA INDIKASI :

- Karena kurangnya data klinis, Cetirizine jangan digunakan selama trimester pertama kehamilan atau saat menyusui.
- Penyakit ginjal berat.
- Hipersensitivitas terhadap Cetirizine Hydrochloride.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak diatas 12 tahun :

10 ml x sehari

Anak-anak :

6 - 12 th : 10 ml x sehari

2 - 6 th : 5 ml x sehari

1 - 2 th : 2,5 ml x sehari

6 bulan - 1 th : 2,5 x sehari

(penggunaan tidak lebih 1 minggu)

NIE : DKL 1923415637 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Kofiren

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Chlorphenamine Maleate 4 mg



INDIKASI :

Meringankan gejala alergi seperti urtikaria, rhinitis dan hay-fever.

KONTRA INDIKASI :

Pasien yang hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Box, 20 amplop @ 1 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa : 1 tablet 3 - 4 x sehari
Anak 6 - 12 th : ½ tablet 3 - 4 x sehari

NIE : DKL 0823410410 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pindo perdana
Semarang - Indonesia

Miratadin[®] Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Loratadine 10 mg



INDIKASI :

- Mengurangi gejala yang berkaitan dengan rinitis alergi, seperti bersin-bersin, pilek dan rasa gatal pada hidung, rasa gatal dan terbakar pada mata.
- Juga mengurangi gejala dengan tanda-tanda urtikaria kronik serta penyakit dermatologik alergi lain.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitif atau idiosinkrasi terhadap komponen-komponennya.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

ATURAN PAKAI :

Dewasa dan anak-anak di atas 12 th :

1 x sehari

Anak-anak 2 - 12 th :

BB >30 kg : 10 mg

BB >30 kg : 5 mg

NIE : DKL 0423407104 A1

Sole Distributor :



sam pindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pinarindo perdana
Semarang - Indonesia

Miratadin[®] Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5 ml) mengandung :
Loratadine 5 mg



INDIKASI :

- Mengurangi gejala yang berkaitan dengan rinitis alergi, seperti bersin-bersin, pilek dan rasa gatal pada hidung, rasa gatal dan terbakar pada mata.
- Juga mengurangi gejala dengan tanda-tanda urtikaria kronik serta penyakit dermatologik alergi lain.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitif atau idiosinkrasi terhadap komponen-komponennya.

KEMASAN :

Dus, Botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa, usia lanjut dan anak-anak di atas 12 th :
sehari 2 sendok takar (5 ml)
Anak-anak 2 - 12 th :
BB >30 kg : sehari 2 sendok takar (5 ml)
BB >30 kg : sehari 1 sendok takar (5 ml)

NIE : DKL 0423407437 A1

Sole Distributor :



sam pinarindo
putra trading

KARDIOVASKULER



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Bisophar 5

Tablet Salut Selaput



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Bisoprolol Fumarate 5 mg

INDIKASI :

1. Mengobati Hipertensi
2. Mengobati penyakit jantung koroner.

KONTRA INDIKASI :

- gagal jantung akut
- syok kardiogenik
- gejala hipotensi
- blok sinoatrial
- hipersensitif bisoprolol

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet salut selaput

DOSIS :

Dewasa : 5 mg Bisophar 1 x sehari

NIE : DKL 2523417317 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putral trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cardipin 10

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Amlodipine Besilate 10 mg



INDIKASI :

Amlodipine diindikasikan untuk pengobatan hipertensi dan dapat digunakan sebagai obat tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada kebanyakan pasien. Pasien-pasien yang tidak cukup dikontrol hanya dengan dengan satu obat antihipertensi.

KONTRA INDIKASI :

Amlodipine merupakan kontraindikasi pada pasien-pasien yang diketahui sensitif terhadap dihidropiridin.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10

DOSIS :

Dewasa : 5 - 10 mg 1 x sehari
Anak-anak 6 - 17 th : 2 ½ - 5 mg 1 x sehari

NIE : DKL 1823414604 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cardipin 5

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Amlodipine Besilate 5 mg



INDIKASI :

Amlodipine diindikasikan untuk pengobatan hipertensi dan dapat digunakan sebagai obat tunggal untuk mengontrol tekanan darah pada kebanyakan pasien. Pasien-pasien yang tidak cukup dikontrol hanya dengan satu obat antihipertensi.

KONTRA INDIKASI :

Amlodipine merupakan kontraindikasi pada pasien-pasien yang diketahui sensitif terhadap dihidropiridin.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10

DOSIS :

Dewasa : 5 - 10 mg 1 x sehari
Anak-anak 6 - 17 th : 2 ½ - 5 mg 1 x sehari

NIE : DKL 1523413010 A1 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cortavas 20

Tablet Salut Selaput



KOMPOSISI :

Tiap tablet salut selaput mengandung :
Simvastatin 20 mg



INDIKASI :

- dapat dipertimbangkan penggunaannya pada individu yang mengalami peningkatan risiko atherosclerosis vaskuler yang disebabkan oleh hiperkolesterolemia.
- Merupakan penunjang pada diet ketat bila respon terhadap diet dan pengobatan non-farmakologi tunggal lainnya tidak memadai.
- Penyakit jantung koroner.
- Hiperkolesterolemia.

KONTRA INDIKASI :

- Hipersensitif terhadap simvastatin.
- Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum.
- Wanita hamil dan menyusui.

KEMASAN :

Box, 5 strip @ 10 tablet salut

DOSIS :

5 - 10 mg sehari sebagai dosis tunggal pada malam hari.

NIE : DKL 1923415117 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cortavas 10

Tablet Salut Selaput



KOMPOSISI :

Tiap tablet salut selaput mengandung :
Simvastatin 10 mg

INDIKASI :

- dapat dipertimbangkan penggunaannya pada individu yang mengalami peningkatan risiko atherosclerosis vaskuler yang disebabkan oleh hiperkolesterolemia.
- Merupakan penunjang pada diet ketat bila respon terhadap diet dan pengobatan non-farmakologi tunggal lainnya tidak memadai.
- Penyakit jantung koroner.
- Hiperkolesterolemia.

KONTRA INDIKASI :

- Hipersensitif terhadap simvastatin.
- Penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum.
- Wanita hamil dan menyusui.

KEMASAN :

Box, 5 strip @ 10 tablet salut

DOSIS :

5 - 10 mg sehari sebagai dosis tunggal pada malam hari.

NIE : DKL 1923415117 B1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Tensifor 16

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Candesartan Cilexetil 16 mg



Candesartan Cilexetil adalah obat yang termasuk dalam golongan angiotensin II receptor blocker (ARB)

KEGUNAAN :

1. Mengobati Hipertensi
2. Mengobati Gagal Jantung kongestif.
3. Melindungi fungsi ginjal pada penderita diabetes

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 4 mg per hari, respon pengobatan 16 mg

NIE : DKL 2523417210 A1

PERHATIAN :

Pada kombinasi Candesartan dan Aliskiren tidak dianjurkan karena ada penggunaan risiko hipotensi, hiperkalemia, dan perubahan fungsi ginjal.

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Tensifor 8

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Candesartan Cilexetil 8 mg



Candesartan Cilexetil adalah obat yang termasuk dalam golongan angiotensin II receptor blocker (ARB)

KEGUNAAN :

1. Mengobati Hipertensi
2. Mengobati Gagal Jantung kongestif.
3. Melindungi fungsi ginjal pada penderita diabetes

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 4 mg per hari, respon pengobatan 16 mg

NIE :

PERHATIAN :

Pada kombinasi Candesartan dan Aliskiren tidak dianjurkan karena ada penggunaan risiko hipotensi, hiperkalemia, dan perubahan fungsi ginjal.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

SUPLEMEN

Suplemen Makanan **Berovit-CE[®]** kapsul



KOMPOSISI & INFORMASI NILAI GIZI :

Tiap kapsul mengandung :

		%AKG
Beta karoten	6 mg	500
Vitamin C	100 mg	111
Vitamin E	25 mg	166

% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.



KEGUNAAN :

Membantu memenuhi kebutuhan Vitamin A, Vitamin C dan Vitamin E.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kapsul

ATURAN PAKAI :

Dewasa dan anak > 12 th : 1 kapsul sehari

NIE : POM SD. 061 327 461

PERINGATAN & PERHATIAN :

- Bila terjadi hiperkarotenemia sebaiknya pemberian obat dihentikan untuk sementara.
- Keamanan penggunaan pada wanita hamil belum diketahui dengan pasti.

EFEK SAMPING :

Pada pemakaian berlebih dapat menimbulkan hiperkarotenemia, alopesia, kelemahan, mual, muntah, sakit kepala, diare dan demam.

Sole Distributor :

Suplemen Makanan

Bionicom-C

Kaplet Salut Selaput




KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

			%AKG
Vitamin C	150	mg	165
Niacinamide	50	mg	335
Calcium Pantothenate	20	mg	365
Vitamin B1	50	mg	2840
Vitamin B2	25	mg	1565
Vitamin B6	10	mg	10
Vitamin B12	5	mcg	165

% AKG berdasarkan pada diet 2150 KKal



Bionicom-C adalah kombinasi vitamin B kompleks, vitamin C, Niacinamide dan Calcium pantothenate yang penting untuk memelihara kesehatan.

KEGUNAAN :

Suplementasi vitamin untuk membantu memelihara kesehatan tubuh.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 kaplet salut

DOSIS :

1 x sehari 1 kaplet salut selaput

NIE : POM SD. 141 546 251

PERHATIAN :

Bila penderita mengeluh karena gangguan lambung, lebih baik dimulai dengan setengah kaplet sehari sesudah makan.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

Bionicom-C 500

Kaplet Salut Selaput




KOMPOSISI :

Tiap kaplet salut mengandung :

		%AKG
Ascorbic Acid	500 mg	555
Niacinamide	50 mg	335
Calcium Pantothenate	20 mg	365
Thiamine HCl	50 mg	3185
Riboflavin	25 mg	1565
Pyridoxine HCl	10 mg	635
Cyanocobalamin	5 mcg	210

% AKG berdasarkan diet 2150 K Kalori



KEGUNAAN :

Bionicom - C 500 adalah kombinasi vitamin B kompleks dan vitamin C, Niacinamide dan Calcium Pantothenate yang penting untuk memelihara tubuh.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 Kaplet salut selaput

ATURAN PAKAI :

1 kali sehari 1 Kaplet salut selaput

NIE : POM SD. 201 580 071

Sole Distributor :



sampharindo
putratrading

Bionicom-C 500

Kaplet Salut Selaput



KOMPOSISI :

Tiap kaplet salut mengandung :

		%AKG
Ascorbic Acid	500 mg	555
Niacinamide	50 mg	335
Calcium Pantothenate	20 mg	365
Thiamine HCl	50 mg	3185
Riboflavin	25 mg	1565
Pyridoxine HCl	10 mg	635
Cyanocobalamin	5 mcg	210

% AKG berdasarkan diet 2150 K Kalori



KEGUNAAN :

Bionicom - C 500 adalah kombinasi vitamin B kompleks dan vitamin C, Niacinamide dan Calcium Pantothenate yang penting untuk memelihara tubuh.

KEMASAN :

Box, 10 Amplop @ 1 strip @ 4 Kaplet salut selaput

ATURAN PAKAI :

1 kali sehari 1 Kaplet salut selaput

NIE : POM SD. 201 580 071

Sole Distributor :



sampharindo
 putratrading

Bionicom ZinC

Kaplet Salut Selaput



KOMPOSISI :

Tiap kaplet salut selaput mengandung :

		%AKG
Thiamine HCl (Vitamin B1)	15 mg	955
Riboflavin (Vitamin B2)	15 mg	940
Pyridoxine HCl (Vitamin B6)	20 mg	1265
Cyanocobalamin (Vitamin B12)	12 mcg	500
Folic Acid	400 mcg	165
Ascorbic Acid (Vitamin C)	750 mg	835
Calcium Pantothenate	20 mg	365
Zinc Picolinate	22,5 mg	35
Vitamin E	30 mg	135

% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.



INDIKASI :

Membantu memenuhi kebutuhan vitamin B, C dan E serta mineral zinc untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dan membantu memulihkan kondisi setelah sakit.

KONTRAINDIKASI :

Bionicom ZinC dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitif terhadap salah satu komponen produk.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet salut

DOSIS :

1 kaplet salut selaput sehari, setelah makan.

NIE : POM SD. 201556121

Sole Distributor :



sampharindo
putratrading

Bionicom ZinC

Kaplet Salut Selaput



KOMPOSISI :

Tiap kaplet salut selaput mengandung :

		%AKG
Thiamine HCl (Vitamin B1)	15 mg	955
Riboflavin (Vitamin B2)	15 mg	940
Pyridoxine HCl (Vitamin B6)	20 mg	1265
Cyanocobalamin (Vitamin B12)	12 mcg	500
Folic Acid	400 mcg	165
Ascorbic Acid (Vitamin C)	750 mg	835
Calcium Pantothenate	20 mg	365
Zinc Picolinate	22,5 mg	35
Vitamin E	30 mg	135

% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.



INDIKASI :

Membantu memenuhi kebutuhan vitamin B, C dan E serta mineral zinc untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dan membantu memulihkan kondisi setelah sakit.

KONTRAINDIKASI :

Bionicom ZinC dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitif terhadap salah satu komponen produk.

KEMASAN :

Box, 10 amplop @ 1 strip @ 6 kaplet salut selaput

DOSIS :

1 kaplet salut selaput sehari, setelah makan.

NIE : POM SD. 201556121

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading

Suplemen Makanan **Calcix - D** kaplet



KOMPOSISI & INFORMASI NILAI GIZI :

Tiap kaplet mengandung :

			%AKG
Calcium Lactate	300	mg	4
Vitamin D	160	IU	25

%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.



KEGUNAAN :

Sebagai suplementasi Kalsium dan Vitamin D
 Untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

- Anak-anak 6 - 12 th. : 1 x sehari 1 kaplet
- Dewasa : 2 x sehari 1 kaplet

NIE : POM SD. 051 523 891

PERINGATAN & PERHATIAN :

- Hati-hati bila digunakan pada penderita gangguan fungsi ginjal atau yang mempunyai riwayat di saluran kandungan kemih.
- Penderita dengan pengobatan glikosida jantung.

Sole Distributor :

Calcomir 500

kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :

Calcium Lactate Pentahydrate	%AKG 500 mg 6%
------------------------------	-------------------

%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.



INDIKASI :

Membantu memenuhi kebutuhan kalsium.

KONTRA INDIKASI :

Penderita dengan pengobatan glikosida jantung.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Secara umum digunakan dosis pemakaian :

3 x sehari, 1-2 kaplet.

Atau menurut petunjuk dokter

NIE : POM SD 191555111

PERINGATAN & PERHATIAN :

Hati - hati diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal dan riwayat batu saluran kemih.

Sole Distributor :



sampharindo
putratrading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

MIRANEURO

Tablet salut selaput



KOMPOSISI :

Tiap tablet salut selaput mengandung :

Thiamine Hydrochloride	100 mg
Piridoxine Hydrochloride	200 mg
Cyanocobalamin	200 mcg

INDIKASI :

Untuk pengobatan kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 seperti pada polineuritis

KONTRA INDIKASI :

Hipersensitif terhadap komponen obat ini.

KEMASAN :

Box, 10 amplop @ 1 strip @ 10 tablet salut selaput

DOSIS :

1 tablet salut selaput sehari atau menurut petunjuk dokter.

NIE : DBL 1723413717 A1



EFEK SAMPING:

Pemakaian vitamin B6 dosis besar dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan sindroma neuropati.

PERINGATAN & PERHATIAN :

Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi levodopa.

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Suplemen Makanan

Samce 500

Kaplet

KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

Vitamin C 500 mg



Samce 500 adalah vitamin C yang penting untuk memelihara kesehatan.

KEGUNAAN :

Suplementasi vitamin untuk membantu memelihara kesehatan tubuh.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 kaplet

DOSIS :

1 x sehari 1 kaplet salut selaput

NIE : POM SD255005071

PERHATIAN :

Bila penderita mengeluh karena gangguan lambung, lebih baik dimulai dengan setengah kaplet sehari sesudah makan.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

Suplemen Kesehatan

Vitade 1000

Vitamin D3 1000 IU



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

%AKG

Cholecalciferol 1000 IU setara
dengan Vitamin D3 25 mikrogram
% AKG berdasarkan pada diet 2150 KKal

165

INDIKASI :

Memenuhi kebutuhan Vitamin D dengan cepat pada kondisi tertentu seperti :

- Lanjut usia.
- Ibu hamil dan menyusui.
- Resiko tinggi / penderita penyakit infeksi atau penderita penyakit autoimun.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita dengan hipersensitivitas dengan Vitamin D dan analognya atau dengan komponen lain dalam formula.
- Hiperkalsemia dan hiperkalsiuria.
- Kalsium nefrolitiasis, nefrokalsinosis, hipervitaminosis D.
- Kerusakan ginjal berat dan gagal ginjal.

KEMASAN :

Box, 5 Strip @ 10 tablet

DOSIS : 1 x sehari 1 tablet

NIE : POM SD. 211585291



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading

Suplemen Makanan **Bionick Mild** sirup



KOMPOSISI :

Takaran Saji (5 ml)			%AKG
DHA	10	mg	-
L-lisin HCl (sintetis)	100	mg	-
Vitamin A	1000	IU	50
Vitamin D	200	IU	35
Vitamin B1 HCl	3	mg	190
Vitamin B2	2	mg	125
Vitamin B6 HCl	2	mg	125
Vitamin B12	2,5	mcg	105
Niasinamida	10	mg	65
Kalium Pantotenat	3	mg	55

% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.



KEGUNAAN :

- Mengandung metabolisme pada masa pertumbuhan.
- Membantu memenuhi kebutuhan vitamin A, vitamin B, vitamin D dan L-lisin.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

ATURAN PAKAI :

1 x sehari 1 -2 sendok takar (5 ml).

NIE : POM SD. 061 626 261

PERINGATAN & PERHATIAN :

- Mengandung pemanis buatan Natrium sakarin dan Natrium siklamat.
- Tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 1 tahun.

Sole Distributor :




sam pharindo
 putratrading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Suplemen Makanan **Vitabiol** sirup



KOMPOSISI :

Takaran Saji (5 ml)			%AKG
Vitamin A	5000	SI	375
Vitamin D3	400	SI	65
Vitamin B1 HCl	3	mg	170
Vitamin B2	2,75	mg	130
Vitamin B6 HCl	1	mg	65
Vitamin B12	5	mcg	210
Niasinamida	20	mg	135
L-Lisin HCl	200	mg	-

% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Mengandung alkohol tidak lebih dari 1 %.



Vitabiol sirup adalah kombinasi asam amino esensial, lisin dengan multivitamin dalam bentuk sirup dengan aroma dan rasa lemon. Vitabiol bekerja sebagai koenzim dalam reaksi metabolisme tubuh.

KEGUNAAN

Membantu memenuhi kebutuhan vitamin pada anak-anak.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

ATURAN PAKAI :

Anak-anak usia 1 - 4 th. : sehari 1 x $\frac{1}{2}$ sendok takar
Dewasa & Anak > 4 th. : sehari 1 x 1 sendok takar

NIE : POM SD. 021 601 671

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

The background is a light blue gradient with a network of thin white lines connecting various nodes. Some nodes are represented by hexagons, others by circles, and some by larger, more complex geometric shapes. The overall aesthetic is scientific and technological.

SALURAN **CERNA**



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mantino® 50 Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Dimenhidrinat 50 mg



INDIKASI :

Mual, muntah, mabuk perjalanan.

KONTRA INDIKASI :

Bagi penderita yang hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa dan anak 12 th keatas : 1 tablet
Anak-anak 8-12 th : ½ tablet
Anak-anak 5-8 th : ¼ tablet
Diminum ½ jam sebelum berpergian, jika perlu dapat diulangi tiap 4 jam.

NIE : DTL 0323406110 A1

EFEK SAMPING :

Mengatuk, pusing, mulut kering, sakit kepala, anoreksia, insomnia, ruam kulit, disceria, gangguan psimotor, retensi yrine, konstipasi, peningkatan refluks lambung dan diare.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miradon[®]

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Domperidone maleate 12,7 mg
setara dengan Domperidone Base 10 mg.

INDIKASI :

Dewasa, mual-muntah akut yang disebabkan oleh pemberian Levodopa dan Bromokriptin.

KONTRA INDIKASI :

Domperidone dikontraindikasikan pada pasien dengan intoleransi terhadap obat ini. Tidak boleh digunakan jika serangan motilitas lambung dapat membahayakan seperti adanya pendarahan, obstruksi mekanik atau perforasi gastrointestinal.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

- Dewasa : 10 - 20 mg 3 x sehari dan 10 - 20 mg sekali sebelum tidur malam tergantung respon klinik. Pengobatan jangan melebihi 12 minggu.
- Anak-anak : tidak dianjurkan



NIE : DKL 1523413210 A1

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miradon[®]

Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5ml) sirup mengandung :
Domperidone meleate setara dengan Domperidone 5 mg



INDIKASI :

Dewasa, mual-muntah akut yang disebabkan oleh pemberian Levodopa dan Bromokriptin.

Anak-anak, Tidak dianjurkan.

KONTRA INDIKASI :

Domperidone dikontraindikasikan pada pasien dengan intoleransi terhadap obat ini. Tidak boleh digunakan jika serangan motilitas lambung dapat membahayakan seperti adanya pendarahan, obstruksi mekanik atau perforasi gastrointestinal.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

- Dewasa : 10 - 20 mg 3 x sehari dan 10 - 20 mg sekali sebelum tidur malam tergantung respon klinik. Pengobatan jangan melebihi 12 minggu.

- Anak-anak : tidak dianjurkan

NIE : DKL 0823410933 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putratrading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Primpen® Tablet



KOMPOSISI :

Metoclopramide HCl

10 mg

INDIKASI :

- Meringankan/mengurangi diabetic gastroparesis akut dan yang kambuh kembali.
- Menghilangkan rasa panas sehubungan dengan reflux esophagitis.
- Menanggulangi mual dan muntah metabolik karena obat atau sesudah operasi.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita epilepsi, keadaan pendarahan gastrointestinal
- Pasien yang hipersensitif atau intoleransi terhadap Metoklopramid.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa : $\frac{1}{2}$ - 1 tablet 3 x sehari, atau menurut petunjuk dokter. Diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur.

NIE : DKL 0423407710 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Primpen[®]
Sirup



KOMPOSISI :

Metoclopramide HCl 5 mg



INDIKASI :

- Meringankan/mengurangi diabetic gastroparesis akut dan yang kambuh kembali.
- Menghilangkan rasa panas sehubungan dengan reflux esophagitis.
- Menanggulangi mual dan muntah metabolik karena obat atau sesudah operasi.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita epilepsi, keadaan pendarahan gastrointestinal
- Pasien yang hipersensitif atau intoleransi terhadap Metoklopramid.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa : sehari 3 x 1 - 2 sendok takar(5ml) sebelum makan.
Anak-anak : usia 5 - 9 th (20 - 29 kg) 2,5 mg 3 x sehari
usia 9 - 14 th (30 kg atau lebih) 5 mg 3 x sehari

NIE : DKL 0623409137 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

Primodiar[®]2

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Loperamida HCl 2 mg



INDIKASI : Diare akut non spesifik dan diare kronik.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang hipersensitif terhadap Loperamide
 - Anak-anak di bawah usia 12 th
 - Wanita hamil dan menyusui.
- Kolitis akut, karena dapat menyebabkan megacolon toksik.
- Pada keadaan dimana konstipasi harus dihindari.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Diare akut :

Dosis awal : 4 mg ; Dosis lazim : 2 - 4 mg

1 - 2 kali sehari.

Diare Kronik : 4 - 8 mg/hari dalam dosis terbagi.

Dosis Maksimal : 16 mg/hari

NIE : DKL 9623404610 A1

Sole Distributor :



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Carsida®

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet kunyah mengandung :

Aluminium Hidrosikda dried gel	307,5	mg
(setara dengan Aluminium Hydroxide 250 mg)		
Magnesium Hidrosikda	250	mg
Simetikon aktif	50	mg

INDIKASI :

Untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus, dua belas jari dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung dan perasaan penuh pada lambung.



KONTRA INDIKASI :

Jangan diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal yang berat karena dapat menimbulkan hipermagnesia (kadar magnesium dalam darah meningkat).

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet kunyah

DOSIS :

Dewasa : 1 - 2 tablet 3 - 4 x sehari

Anak-anak 6-12 th : ½ - 1 tablet 3 - 4 x sehari

Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur.

NIE : DBL 9423403863 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putratrading

Carsida®


Suspensi



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5 ml) mengandung :

Aluminium Hidrosikda	250 mg
Magnesium Hidrosikda	250 mg
Simetikon aktif	50 mg



INDIKASI :

Untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus, dua belas jari dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung dan perasaan penuh pada lambung.

KONTRA INDIKASI :

Jangan diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal yang berat karena dapat menimbulkan hipermagnesia (kadar magnesium dalam darah meningkat).

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa : 1 - 2 sendok takar (5-10 ml) 3 - 4 x sehari

Anak-anak : 6 - 12 tahun $\frac{1}{2}$ - 1 sendok takar (2,5-5 ml) 3 - 4 x sehari

Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur.

NIE : DBL 9623404733 A1

Sole Distributor :

The background features a light blue and green color scheme. It is decorated with several faint, stylized chemical structures, including hexagons and interconnected nodes, suggesting a scientific or biological theme. A network of thin lines connects various points across the page, creating a web-like pattern.

SALURAN **NAFAS**



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Coparcetin[®] kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :

Paracetamol	500 mg
Guaifenesin	100 mg
Pseudoephedrine Hcl	30 mg
Chlorpheniramine maleate	2 mg

INDIKASI :

Untuk meringankan demam, batuk berdahak dan pilek.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang terlalu sensitif terhadap komponen obat.
- Pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan penyakit hati yang aktif.
- Penderita yang sensitif terhadap obat pereda hidung tersumbat lain.
- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.

KEMASAN :

Box, 10 amplop @ 1 strip @ 10

DOSIS :

Dewasa dan anak > 12 th : 3 x sehari

Anak-anak 6 - 12 th : 3 x sehari ½ kaplet

NIE : DTL 9723405004 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

Coparcetin[®] Sirup



KOMPOSISI :

Paracetamol	120 mg
Guaifenesin	50 mg
Pseudoephedrine HCl	7,5 mg
Chlorpheniramine maleate	0,5 mg
Ethanol 96%	1,6 % v/v



INDIKASI :

Untuk meringankan demam, batuk berdahak dan pilek.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang terlalu sensitif terhadap komponen obat.
- Pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan penyakit hati yang aktif.
- Penderita yang sensitif terhadap obat pereda hidung tersumbat lain.
- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Anak-anak 6 - 12 th : 3 x sehari
1 sendok takar (5 ml)

NIE : DTL 7223404837 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putratrading

Coparcetin[®] Sirup



Rasa Jeruk

KOMPOSISI :

Paracetamol	120 mg
Guaifenesin	50 mg
Pseudoephedrine HCl	7,5 mg
Chlorpheniramine maleate	0,5 mg
Ethanol 96%	1,6 % v/v



INDIKASI :

Untuk meringankan demam, batuk berdahak dan pilek.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang terlalu sensitif terhadap komponen obat.
- Pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan penyakit hati yang aktif.
- Penderita yang sensitif terhadap obat pereda hidung tersumbat lain.
- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Anak-anak 6 - 12 th : 3 x sehari
1 sendok takar (5 ml)

NIE : DTL 0423408737 A1

Sole Distributor :



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Coparcetin[®] Kid Cough Sirup



KOMPOSISI :

Paracetamol	120 mg
Guaifenesin	50 mg
Chlorpheniramine maleate	1 mg



INDIKASI :

Untuk meringankan demam, batuk berdahak dan pilek.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang terlalu sensitif terhadap komponen obat.
- Pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan penyakit hati yang aktif.
- Penderita yang sensitif terhadap obat pereda hidung tersumbat lain.
- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

- 6 - 12 th : 3 x sehari 2 sendok takar
- 2 - 6 th : 3 x sehari 1 sendok takar

NIE : DTL 0323406337 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

Finos Junior

Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar 5 ml sirup mengandung :
 Pseudoephedrine Hcl 15 mg
 Chlorphenamine Meleate 1 mg



INDIKASI :

Meringankan bersin-bersin dan hidung tersumbat karena pilek.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.
- Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif terhadap komponen ini.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

≥ 12 tahun : 2 sendok takar (10 ml) tiap 6-8 jam.
 6 - 12 th : 1 sendok takar (5 ml) tiap 6-8 jam.
 Di bawah 6 tahun atas petunjuk dokter

NO. REG. : DTL 1523412737 A1

Sole Distributor :

Fluanza

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :

Paracetamol	500 mg
Dextromethorphan Hbr	15 mg
Phenylpropanolamine HCl	12,5 mg
Chlorpheniramine maleate	2 mg



INDIKASI :

Meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.
- Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif terhadap komponen ini.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Dewasa : 1 kaplet 3 x sehari

Anak 6 - 12 th : ½ kaplet 3 x sehari

NIE : DTL 1723414004 A1

Sole Distributor :



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Fluanza

Sirup



KOMPOSISI :

Paracetamol	125 mg
Dextromethorphan Hbr	3,75 mg
Phenylpropanolamine HCl	3,125 mg
Chlorpheniramine maleate	0,5 mg
Ethanol 96 %	1,6 % v/v



INDIKASI :

Meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.
- Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif terhadap komponen ini.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

6 - 12 th : 3 x sehari 2 sendok takar (10 ml)

NO. REG. : DTL 1523412737 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pinarindo perdana
Semarang - Indonesia

Millsen[®] Sirup



KOMPOSISI :

Paracetamol	120 mg
Dextromethophan Hbr	3,5 mg
Phenylpropanolamine HCl	25 mg
Chlorpheniramine maleate	1 mg
Alkohol 96 %	1,6 % v/v



INDIKASI :

Meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus.
- Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif terhadap komponen ini.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Anak 6 - 12 th : 3 - 4 x sehari
2 sendok takar

NIE : DTL 012345337 A1

Sole Distributor :



sam pinarindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Guamin[®] Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5 ml) sirup mengandung :
Promethazine HCl 5 mg
Guaifenesin 60 mg



INDIKASI :

Batuk berdahak yang disertai gejala alergi

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang peka terhadap Diphenhydramine.
- Wanita menyusui, bayi baru lahir atau prematur.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

ATURAN PAKAI :

Anak-anak 2-5 th :

3-4 x sehari ½ sendok takar

Anak-anak 6-12 th :

3-4 x sehari 1 sendok takar

Dewasa atau anak di atas 12 th :

3-4 x sehari 1-2 sendok takar
atau menurut petunjuk dokter.

NIE : DTL 9123401537 A1

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miradryl[®] Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5 ml) sirup mengandung :

Diphenhydramine HCl	12,5 mg
Ammonium Chloride	125,0 mg
Ethanol 96 %	3% v/v



INDIKASI :

Meredakan batuk yang disebabkan alergi yang disertai dahak berlebihan.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang peka terhadap Diphenhydramine.
- Wanita menyusui, bayi baru lahir atau prematur.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Anak 6 - 12 th : 3 - 4 x sehari 2 sendok takar

NIE : DTL 0423407237 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mirapect® Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Ambroxol HCL 30 mg



INDIKASI :

Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis pernafasan.

KONTRA INDIKASI :

Hipersensitif terhadap Ambroxol HCL.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

ATURAN PAKAI :

- Dewasa & Anak di atas 12 th
2 - 3 x sehari 1 tablet
- Anak di bawah 12 th 2 - 3 x sehari ½ tablet

NIE : DTL 0423407910 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pindo perdana
Semarang - Indonesia

Mirapect® Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5 ml) sirup mengandung :
Ambroxol HCl 15 mg



INDIKASI :

Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis pernafasan.

KONTRA INDIKASI :

Hipersensitif terhadap Ambroxol HCL.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Anak

6 - 12 th : 2 - 3 x sehari 1 sendok takar (5 ml)

2 - 6 th : 3 x sehari ½ sendok takar (5 ml)

di bawah 2 th : 2 x sehari ½ sendok takar (5 ml)

NIE : DTL 0423408337 A1

Sole Distributor :



sam pindo perdana
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miravon[®]
Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Bromhexine HCl 8 mg



INDIKASI :

Bekerja sebagai mukolitik untuk meredakan batuk berdahak.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitif terhadap Bromhexine

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

- Dewasa & Anak di atas 10 th
3 x sehari 1 tablet
- Anak 5 - 10 th : 3 x sehari ½ tablet
- Anak 2 - 5 th : 2 x sehari ½ tablet

NIE : DTL 0423406610 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

Miravon[®] Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5 ml) mengandung :
Bromhexine HCl 4 mg
Etanol 96 % 2,35 % v/v



INDIKASI :

Bekerja sebagai mukolitik untuk meredakan batuk berdahak.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitif terhadap Bromhexine

KEMASAN :

Dus, Botol @ 60 ml

DOSIS :

- Dewasa & Anak di atas 10 th
3 x sehari 2 sendok takar (5 ml)
- Anak 5 - 10 th : 3 x sehari 1 sendok takar (5 ml)
- Anak 2 - 5 th : 2 x sehari 1 sendok takar (5 ml)

NIE : DTL 0323406237 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

OBH SEKAR Sirup



KOMPOSISI :

Tiap 15 ml sirup mengandung :

Succus Liquiritiae	500 mg
Ammonium Chloride	150 mg
Ammonia 10 %	60 mg
Oleum Anise	12 mg
Menthol	1,5 mg
Ethanol	1,8 % v/v



INDIKASI :

Bekerja sebagai mukolitik untuk meredakan batuk berdahak.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita gangguan jantung dan diabetes melitus.
- Penderita gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita yang hipersensitif terhadap salah satu komponen obat.

KEMASAN :

Dus, 1 Botol @ 100 ml

DOSIS :

- Dewasa :
3 x sehari 1 sendok makan (15 ml)
- Anak-anak :
3 x sehari ½ sendok makan (7,5 ml)

NIE : DBL 0423407537 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
samharindo perdana
Semarang - Indonesia

Astein²⁰⁰

N-Acetylcysteine Kapsul



KOMPOSISI :

Tiap kapsul mengandung :
N-Acetylcysteine 200 mg



INDIKASI :

Mukolitik terapi pada akut dan kronik penyakit bronkial dan paru dengan mucus yang tebal, seperti : akut bronchitis, bronchitis kronis dan akut berulang, pulmonary emphysema, mucoviscidosis,

KONTRA INDIKASI :

Hipersensitivitas terhadap N-Acetylcysteine atau bahan-bahan lainnya.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 kapsul

DOSIS :

Dewasa dan anak di atas 14 tahun : 1 kapsul
2-3 x sehari

Untuk anak 6 - 14 tahun : 1 kapsul 2 x sehari

NIE : DKL 1023411701 A1

Sole Distributor :



samharindo
putra trading




PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Proast[®] Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok (5 ml) sirup mengandung :
Salbutamol sulfate 2 mg



INDIKASI :

Kejang bronkus pada semua jenis asthma bronkia, bronkitis kronis dan emphysema.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Dus, Botol @ 60 ml

ATURAN PAKAI :

- Dewasa (> 12 th) : 1 - 2 sendok takar @ 5 ml 3 - 4 x sehari
- Anak-anak :
 - 2 - 6 th : ½ - 1 sendok takar @ 5 ml 3 - 4 x sehari
 - 6 - 12 th : 1 sendok takar @ 5 ml 3 - 4 x sehari

NIE : DKL 0623409737 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

The background is a light blue gradient with a complex network of thin white lines connecting various nodes. Some nodes are represented by hexagons, others by circles, and some by larger, more complex geometric shapes. The overall aesthetic is scientific and technological, suggesting a network or molecular structure.

SISTEM SARAF



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mirasic-Plus[®]

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :

Paracetamol	500	mg
Caffeine	50	mg



INDIKASI :

Meringankan sakit kepala, sakit gigi.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Dewasa : 1 kaplet 3 - 4 x sehari

Anak-anak 6 - 12 th : $\frac{1}{2}$ - 1 kaplet 3 - 4 x sehari
atau sesuai petunjuk dokter.

NIE : DBL 0723410204 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mirasic Forte® Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Paracetamol 650 mg



INDIKASI :

Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

KONTRA INDIKASI :

Tidak boleh digunakan untuk penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Dewasa : 1 kaplet 3 - 4 x sehari
Anak-anak 6 - 12 th : $\frac{1}{2}$ - 1 kaplet
3 - 4 x sehari

NIE : DBL 0623402704 B1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mirasic[®] 500 Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Paracetamol 500 mg

INDIKASI :

Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

KONTRA INDIKASI :

Tidak boleh digunakan untuk penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Secara umum dapat digunakan dosis pemakaian sebagai berikut :

- Dewasa atau anak-anak diatas 12 th. :
1 kaplet 3 - 4 x sehari
- Anak-anak 6-12 th. : ½ kaplet

NIE : DBL 0123402704 A2



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

Mirasic[®]
Sirup



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar (5 ml) mengandung :
 Paracetamol 120 mg
 Alkohol 96 % 1,6 % v/v



INDIKASI :

Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

KONTRA INDIKASI :

Tidak boleh digunakan untuk penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Dus, Botol @ 60 ml

DOSIS :

0 - 1 tahun : ½ sendok takar (2,5 ml)
 1 - 2 tahun : 1 sendok takar (5 ml)
 2 - 6 tahun : 1-2 sendok takar (5-10 ml)
 6 - 9 tahun : 2-3 sendok takar (10-15 ml)
 9 - 12 tahun : 3-4 sendok takar (15-20 ml)

Umur	Dosis	Takaran pipet
Di bawah 1 tahun	60 mg 60 - 120 mg	1 alat tetes 1 - 2 alat tetes

NIE : DBL 9223401837 A1

Sole Distributor :

Purinic[®] Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Allopurinol 300 mg



INDIKASI :

- Hiperurisemia primer
- Hiperurisemia sekunder, mencegah pengendapan asam urat dan kalsium oksalat produksi berlebihan asam urat antara lain pada keganasan, polisitemia vera, terapi sitostatik.

KONTRA INDIKASI :

Penderita hipersensitif terhadap allopurinol dan keadaan serangan jantung akut.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal : 100 - 300 mg sehari

Dosis pemeliharaan : 200 - 600 mg sehari

Dosis tunggal maksimum 300 mg

Bila diperlukan diberikan dosis lebih tinggi maksimal 900 mg

NIE : DKL 0723410010 A1

Sole Distributor :

 **sam pharindo**
putra trading

Purinic 100 Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :
Allopurinol 100 mg

INDIKASI :

- Hiperurisemia primer
- Hiperurisemia sekunder, mencegah pengendapan asam urat dan kalsium oksalat produksi berlebihan asam urat antara lain pada keganasan, polisitemia vera, terapi sitostatik.

KONTRA INDIKASI :

Penderita hipersensitif terhadap allopurinol dan keadaan serangan jantung akut.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal : 100 - 300 mg sehari
Dosis pemeliharaan : 200 - 600 mg sehari
Dosis tunggal maksimum 300 mg
Bila diperlukan diberikan dosis lebih tinggi maksimal 900 mg

NIE : DKL 1823410010 B1



Sole Distributor :

Axaprofen[®] kaplet



KOMPOSISI :

tiap kaplet mengandung :

Paracetamol	350 mg
Ibuprofen	200 mg

INDIKASI :

Meringankan rasa nyeri pada sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri haid, dan menurunkan demam.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap paracetamol, ibuprofen atau obat antiinflamasi non-steroid yang lain.
- Penderita dengan ulkus peptikum yang berat dan aktif.
- Penderita di mana bila menggunakan aspirin atau obat-obat antiinflamasi non-steroid lainnya timbul gejala asthma, rinitis atau urtikaria.
- Kehamilan tiga bulan terakhir.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

3 x sehari 1 kaplet salut selaput

NIE : DTL 1423412504 A1



Sole Distributor :



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Axofen[®]
Suspensi



KOMPOSISI :

tiap takar (5 ml) mengandung :
Ibuprofen 100 mg



INDIKASI :

Menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada dismenore primer (nyeri haid), nyeri pada penyakit gigi, sakit kepala.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita dengan tukak lambung yang berat dan aktif.
- Penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap ibuprofen.
- Penderita dimana bila menggunakan astesal atau obat anti inflamasi non steroid lainnya akan timbul gejala asthma.
- Kehamilan trimester ketiga.

KEMASAN :

Dus, botol @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa : sehari 3 - 4 x 2 sendok takar
Anak-anak : 20 mg/kg BB sehari dalam dosis terbagi

NIE : DTL 0823410833 A1

Sole Distributor :



sampharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Caranal Forte

kaplet salut selaput



KOMPOSISI :

Metamizole Sodium	500 mg
Thiamine Hcl	50 mg
Pyridoxine Hcl	100 mg
Cyanocobalamine	100 mcg



INDIKASI :

Meringankan rasa nyeri yang disebabkan oleh neuritis dan neuralgia, terutama pada keadaan rasa nyeri yang berat.

KONTRA INDIKASI :

- Hipersensitivitas terhadap komponen obat ini.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Penderita dengan tekanan darah sistolik kurang dari 100 mmHg.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet salut selaput

DOSIS :

3 x sehari 1 kaplet salut

NIE : DKL 1923415309 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cargesik[®] 500 kaplet



KOMPOSISI :

Tiap kaplet mengandung :
Mefenamic 500 mg

INDIKASI :

Meredam nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, termasuk karena trauma, nyeri otot dan nyeri sesudah operasi.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang hipersensitif terhadap mefenamic acid.
- Penderita yang dengan asetosal mengalami bronkospasme.
- Penderita dengan tukak lambung dan usus.
- Penderita dengan gangguan ginjal yang berat.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Secara umum dapat digunakan :

Dewasa dan anak-anak > 14 th

Dosis awal : 500 mg, dilanjutkan 250 mg tiap 6 jam sesuai kebutuhan.

Pemakaian obat sebaiknya sesudah makan.

NIE : DKL 9323402504 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putra trading

Miracloven

Tablet salut



KOMPOSISI :

Tiap kapsul mengandung :
Diclofenac potassium 50 mg



INDIKASI :

- Pengobatan akut dan khronis pada gejala rheumatoid arthritis, osteoarthritis dan ankylosing spondylitis.
- Mengurangi sakit dan dysmenorhe primer bila dikehendaki pengurangan rasa sakit segera.

KONTRA INDIKASI :

Tukak lambung atau usus, hipersensitivitas terhadap zat-zat tambahan.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa : Dosis awal harian yang dianjurkan 100 - 150 mg.
dosis harian umumnya dibagi dalam 2 - 3 dosis.
tablet miracloven harus ditelan secara utuh dengan cairan, sebaiknya sesudah makan.
Anak-anak : tidak direkomendasikan.

NIE : DKL 1523413517 A1

Sole Distributor :



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miradene® 20 kapsul



KOMPOSISI :

Tiap kapsul mengandung :
Piroxicam 20 mg



INDIKASI :

Untuk terapi simptomatik pada artritis reumatoid, osteoarthritis, "ankylosing spondylitis" gout akut, gangguan muskulokeletal.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang peka terhadap piroxicam.
- Penderita yang mempunyai riwayat tukak lambung.
- Penderita yang mengalami bronkospasma.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kapsul

DOSIS :

"Artritis reumatoid dan osteoarthritis" :

20 mg sehari sebagai dosis tunggal atau terbagi. Lama pemakaian cukup 3 hari karena pemakaian lebih dari 3 hari tidak memberikan kemanfaatan dan mungkin ada efek samping yang meningkat.

NIE : DBL 9323403201 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Oxcam[®] 15 Tablet



KOMPOSISI :
tiap tablet mengandung :
Meloxicam 15 mg

INDIKASI :

Oxcam diindikasikan untuk terapi simptomatis jangka pendek eksaserbasi osteoarthritis akut dan terapi simptomatis jangka panjang arthritis rematoid.

KONTRA INDIKASI :

- Pada penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap meloxicam, sebaiknya tidak diberikan pada penderita yang menderita asthma, nasal polyps, angioedema, urtikaria atau alergi setelah menggunakan Asetosal atau AINS yang lain.
- Anak usia di bawah 15 tahun
- Wanita hamil atau menyusui
- Perdarahan saluran pencernaan, perdarahan pembuluh darah otak, atau penyakit perdarahan lainnya.

KEMASAN :

Box, 5 strip @ 10 tablet

DOSIS :

- Rematoid Arthritis : 15 mg/hari
- Osteoarthritis : 7,5 mg/hari
- pada penderita gagal ginjal berat dosis tidak boleh melebihi 7,5 mg/hari. Dosis maksimum Oxcam yang dianjurkan 15 mg/hari

NIE : DKL 0823410610 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Retrofen[®] 100 Kapsul



KOMPOSISI :

Tiap kapsul mengandung :
Ketoprofen 100 mg

INDIKASI :

Mengobati gejala-gejala artritis rematoid, spondilitis ankilosa, gout akut dan osteoarthritis.

KONTRA INDIKASI :

- Hipersensitif terhadap ketoprofen, aspirin dan AINS lain.
- Pasien tukak lambung atau penyakit-penyakit inflamasi akut pada saluran pencernaan.
- Gagal fungsi ginjal dan hati yang berat.

KEMASAN :

Box, 5 strip @ 10 kapsul

DOSIS :

Dosis yang dianjurkan :
75 mg 3 x sehari atau,
50 mg 4 x sehari
Dosis maksimum : 300 mg sehari

NIE : DKL 1123412201 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



TOPIKAL **KULIT**



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mikazol

Krim 2 %



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung :
Miconazole Nitrate 20 mg

INDIKASI :

Infeksi kulit yang disebabkan oleh dermatofit atau ragi, jamur lainnya seperti :

- Pityriasis versicolor (panu)
- Tinea corporis (di leher/badan)
- Tinea cruris (di selangkangan)
- Tinea pedis (di telapak khaki)

KONTRA INDIKASI :

Hipersensitif terhadap Miconazole atau terhadap salah satu komponen obat.

KEMASAN :

Dus, tube @ 10 gram

DOSIS DAN CARA PEMBERIAN :

Oleskan pada permukaan 2 kali sehari. Bila Miconazole krim atau serbuk tabur digunakan bersamaan, pemakaian cukup sekali sehari.

NIE : DTL 1823414229 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putral trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miracort

Krim 2,5 %



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung :
Hydrocortisone Acetate 25 mg



INDIKASI :

Untuk inflamasi non-infeksi pada kulit seperti pada dermatitis atopik, dermatitis kontak, dan reaksi alergi kulit lain yang responsive terhadap kortikosteroid.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang hipersensitif
- Infeksi virus pada kulit (herpes simpleks, vaccinia, varicella)
- Tuberkulosis pada kulit.

DOSIS :

Oleskan tipis pada permukaan yang sakit 2 - 4 x sehari.

KEMASAN :

Dus, tube @ 5 gram

NIE : DKL 1823414529 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putraltrading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Samclovir

Krim 5 %



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung Acyclovir 25 mg



INDIKASI :

Untuk pengobatan infeksi virus herpes simpleks pada kulit termasuk herpes genitalis dan herpes labialis yang inisial dan rekuren.

KONTRA INDIKASI :

Pasien yang bersifat hipersensitif terhadap aciclovir, valaciclovir dan komponen-komponen penyusun krim ini.

KEMASAN :

Dus, tube @ 5 gram

DOSIS :

Aciclovir krim harus digunakan 5x sehari dengan selang waktu +/- 4 jam tanpa pemberian dosis malam hari. Aciclovir harus digunakan sedini mungkin pada awal infeksi dengan cara dioleskan pada lesi atau lesi yang baru timbul. Pengobatan harus diteruskan selama 5 hari apabila penyembuhan belum tercapai, pengobatan boleh dilanjutkan sampai 10 hari.

NIE : DKL 1823415029 A1

ATURAN PAKAI :

Oleskan tipis pada permukaan yang sakit 2 - 4 x sehari.



Sole Distributor :



sampharindo
putral trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sampharindo perdana
Semarang - Indonesia

Valbeson-N

Krim



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung :
Betamethasone Valerate 1,21 mg
Neomycin 5 mg

INDIKASI :

Valbeson-N diindikasikan untuk pengobatan di mana terdapat infeksi bakteri sekunder, diperkirakan muncul atau menyerupai antara lain : Eksim pada dewasa dan anak-anak, termasuk eksimatopik dan

KONTRA INDIKASI :

- Rosacea, jerawat dan dermatitis perioral.
- Pruritus peri-anal dan genital.
- Infeksi virus primer pada kulit. (herpes simpleks, cacar air)
- Hipersensitif terhadap komponen sediaan.
- Terapi lesi infeksi kulit primer yang disebabkan jamur atau bakteri
- Tidak digunakan untuk terapi otitis ektrna ketika terjadi perforasi pada gendang telinga

DOSIS DAN CARA PEMBERIAN :

Dalam jumlah secukupnya oleskan Valbeson-N dengan lembut ke daerah yang sakit dua atau tiga kali sehari sampai terjadi perbaikan. Selanjutnya untuk mempertahankan perbaikan dengan mengoleskan sekali sehari atau lebih jarang.

KEMASAN :

Dus, tube @ 5 gram, krim warna putih

NIE : DKL 2023415829 A1



Sole Distributor :



sampharindo
putral trading


NO	NAMA PRODUK	KOMPOSISI	KEMASAN
1	ACETYLCYSTEINE 200, Kapsul	Acetylcysteine 200 mg	Box, 10 Amplop @1 Strip @10 Kap
2	ACICLOVIR 400, Tablet	Aciclovir 400 mg	Box, 5 Strip @ 10 Tablet
3	ACICLOVIR 5%, Krim	Acyclovir 5 %	1 Tube @ 5 Gram
4	ALLOPURINOL 300, Tablet	Allopurinol 300 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
5	ALLOPURINOL 100, Tablet	Allopurinol 100 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
6	AMBROXOL 30, Tablet	Ambroxol hydrochloride 30 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
7	AMLODIPINE BESILATE 10, Kaplet	Amlodipine 10 mg	Box, 10 Strip @ 10 Kaplet
8	AMLODIPINE BESILATE 5, Tablet	Amlodipine 5 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
9	AMOXICILLIN 500, Kaplet	Amoxicillin 500 mg	Box, 10 Strip @ 10 Kaplet
10	AMOXICILLIN 125, Suspensi Kering	Amoxicillin 125 mg / 5 ml	Botol @ 60 ml
11	AMOXICILLIN 250, Suspensi Kering	Amoxicillin 250 mg / 5 ml	Botol @ 60 ml
12	ANTASIDA 60, Suspensi	Aluminium Hydroxide 200 mg Magnesium Hydroxide 210 mg	Botol @ 60 ml
13	BISOPROLOL 5, Tablet	Bisoprolol Fumarate 5 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
14	CANDESARTAN 16, Tablet	Candesartan Cilexetil 16 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
15	CANDESARTAN 8, Tablet	Candesartan Cilexetil 8 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
16	CETIRIZINE HCL 10 MG, Tablet Salut	Cetirizine hydrochloride 10 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet Salut
17	CETIRIZINE HCL 60 ML, Sirup	Cetirizine hydrochloride 5 mg	Botol @ 60 ml
18	CIPROFLOXACIN 500, Kaplet Salut	Ciprofloxacin 500 mg	Box, 10 Strip @ 10 Kaplet Salut
19	COTRIMOXAZOLE, Tablet	Sulfamethoxazole 400 mg Trimethoprim 80 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
20	COTRIMOKSAZOLE 60, Suspensi	Sulfamethoxazole 200 mg Trimethoprim 40 mg	Botol @ 60 ml
21	DIMENHYDRINATE 50 MG, Tablet	Dimenhydrinate 50 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
22	DOMPERIDONE MALEATE, Tablet	Domperidon Maleate 10 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
23	HYDROCORTISONE ACETATE, Krim	Hydrocortisone Acetate	1 Tube @ 5 Gram
24	IBUPROFEN, Suspensi	Ibuprofen 100 mg / 5 ml	Botol @ 60 ml
25	LOPERAMIDE HCL 2 MG, Tablet	Loperamide Hydrochloride 2 mg	Box, 10 Strip @ 10 Kaplet

NO	NAMA PRODUK	KOMPOSISI	KEMASAN
26	LORATADINE 10, Tablet	Loratadine 10 mg	Box, 10 Amplop @1 Strip @10 Kap
27	MEFENAMIC ACID 500, Kaplet	Mefenamic Acid 500 mg	Box, 10 Strip @ 10 Kaplet
28	METHYLPREDNISOLONE 8, Kaplet	Methylprednisolone 8 mg	Box, 10 Strip @ 10 Kaplet
29	METHYLPREDNISOLONE 4, Tablet	Methylprednisolone 4 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
30	MICONAZOLE NITRATE 2, Krim	Miconazole Nitrate 2%	1 Tube @ 5 Gram
31	PARACETAMOL 500, Kaplet	Paracetamol 500 mg	Botol @ 60 ml
32	PARACETAMOL 60, Sirup	Paracetamol 120 mg / 5 ml	Botol @ 60 ml
33	SALBUTAMOL 4 MG, Tablet	Salbutamol sulfate 4 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet
35	SIMVASTATIN 20 MG, Tablet Salut	Simvastatin 20 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet Salut
36	SIMVASTATIN 10 MG, Tablet Salut	Simvastatin 10 mg	Box, 10 Strip @ 10 Tablet Salut



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Acetylcysteine
Kapsul 200 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kapsul mengandung :
Acetylcysteine 200 mg

INDIKASI :

Acetylcysteine adalah sebagai mukolitik mengencerkan dahak/lendir di saluran napas

KONTRA INDIKASI :

Pasien yang hipersensitif terhadap zat aktif atau zat tambahan obat ini.

KEMASAN :

Box, 10 Amplop @ 1 strip @ 10 Kapsul

DOSIS :

Dewasa & anak >12 th : 1 kapsul 2–3 × sehari

Anak 6–14 tahun : 1 kapsul 2 × sehari

NIE : GTL 2323416501 A1



PERHATIAN :

- Hipersensitivitas terhadap acetylcysteine
- Penyakit tukak lambung aktif
- Asthma berat
- Gangguan hati berat

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Aciclovir Maleate Tablet 400 mg



KOMPOSISI :

Tiap Tablet mengandung :
Aciclovir 400 mg



INDIKASI :

Untuk mengatasi infeksi akibat virus Herpes simpleks dan Varicella zoster.

KONTRA INDIKASI :

Hipersensitivitas terhadap Aciclovir.

KEMASAN :

Box, 5 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa : 200 mg setiap 4 jam atau 5 x sehari selama 5 hari berturut-turut

Anak : Usia > 2 th : 200 mg setiap 4 jam atau 5 x sehari selama 5 hari berturut-turut

Usia < 2 th : ½ dosis dewasa

NIE : GKL 0423408110 B1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Aciclovir

Krim 5 %



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung :
Aciclovir 50 mg



Acyclovir adalah obat antivirus yang bekerja dengan cara menghambat replikasi DNA virus, terutama virus dari kelompok Herpesviridae.

INDIKASI :

Pengobatan infeksi virus herpes simpleks pada kulit termasuk herpes genitalis dan herpes labialis yang inisial dan rekuren.

KONTRA INDIKASI :

Pasien yang bersifat hipersensitif terhadap aciclovir, valaciclovir dan komponen penyusun krim ini.

DOSIS :

Aciclovir krim harus digunakan 5 x sehari dengan selang waktu lebih kurang 4 jam tanpa pemberian dosis malam hari.

KEMASAN :

Tube, @ 5 gram

NIE : GKL 1823414929 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Allopurinol

Tablet 300 mg



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

Allopurinol 300 mg

Allopurinol adalah obat yang digunakan untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim xantin oksidase, yang terlibat dalam pembentukan asam urat dari purin.

KEGUNAAN :

- Menurunkan kadar asam urat dalam darah.
- Mencegah serangan gout (pirai) berulang.
- Mencegah pembentukan batu ginjal dari asam urat.
- Mengurangi hiperurisemia (kadar asam urat tinggi)

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 100 - 300 mg /hari

Dosis pemeliharaan : 200 - 600 mg /hari

Dosis sedang : 300 - 600 mg /hari

NIE :



PERHATIAN :

Awal pengobatan dapat mencetuskan serangan gout akut, jadi sering kali diberikan bersama colchicine atau NSAID pada awal terapi.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Allopurinol

Tablet 100 mg



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

Allopurinol 100 mg



Allopurinol adalah obat yang digunakan untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim xantin oksidase, yang terlibat dalam pembentukan asam urat dari purin.

KEGUNAAN :

- Menurunkan kadar asam urat dalam darah.
- Mencegah serangan gout (pirai) berulang.
- Mencegah pembentukan batu ginjal dari asam urat.
- Mengurangi hiperurisemia (kadar asam urat tinggi)

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 100 - 300 mg /hari

Dosis pemeliharaan : 200 - 600 mg /hari

Dosis sedang : 300 - 600 mg /hari

NIE : GKL 0223405910A1

PERHATIAN :

Awal pengobatan dapat mencetuskan serangan gout akut, jadi sering kali diberikan bersama colchicine atau NSAID pada awal terapi.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Ambroxol HCl

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap Tablet mengandung :

Ambroxol HCl

30 mg

Ambroxol Hcl adalah obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak (mukolitik) pada saluran pernapasan, sehingga memudahkan pengeluaran lendir saat batuk.

INDIKASI :

Sebagai sekeretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis dan bronkitis asmatik.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa & anak diatas 12 th : 2 - 3 x sehari 1 tablet

Anak 6 - 12 th : 2 - 3 x sehari ½ tablet

NIE : GKL 1423412610 A1



KONTRA INDIKASI :

Hipersensitif terhadap Ambroxol.

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Amlodipine Besilate

Kaplet 10 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :
Amlodipine Besilate

10 mg

Amlodipine Besilate adalah obat antihipertensi dari golongan Calcium Channel Blocker (CCB), khususnya kelompok dihidropiridin. Obat ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah, sehingga menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung.



INDIKASI :

- Indikasi Amlodipine Hipertensi
- Angina pectoris
- Penyakit jantung koroner (CAD) Digunakan untuk mencegah kejadian kardiovaskular.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Hipertensi : 5 mg 1× sehari, maksimum 10 mg 1× sehari

Angina stabil & vasospastik : 5 - 10 mg 1× sehari, maksimum 10 mg 1× sehari

Penyakit Jantung Koroner (CAD) : 5 - 10 mg 1× sehari, maksimum 10 mg 1× sehari

NIE : GKL 1823414704 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Amlodipine Besilate Tablet 5 mg



KOMPOSISI :

Tiap Tablet mengandung :
Amlodipine Besilate

5 mg

Amlodipine Besilate adalah obat antihipertensi dari golongan Calcium Channel Blocker (CCB), khususnya kelompok dihidropiridin. Obat ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah, sehingga menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung.



KEGUNAAN :

- Indikasi Amlodipine Hipertensi
- Angina pektoris
- Penyakit jantung koroner (CAD) Digunakan untuk mencegah kejadian kardiovaskular.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 Tablet

DOSIS :

Hipertensi : 5 mg 1× sehari, maksimum 10 mg 1× sehari

Angina stabil & vasospastik : 5 - 10 mg 1× sehari, maksimum 10 mg 1× sehari

Penyakit Jantung Koroner (CAD) : 5 - 10 mg 1× sehari, maksimum 10 mg 1× sehari

NIE : GKL 1823414310 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Amoxicillin Trihydrate

Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :

Amoxicillin Trihydrate 500 mg

Amoxicillin Trihydrate adalah turunan dari penisillin semi sintetik dalam suasana asam lambung. Amoxicillin diabsorpsi dengan cepat dan baik pada saluran pencernaan makanan, tidak tergantung adanya makanan.

INDIKASI :

Infeksi yang disebabkan oleh strain-strain bakteri yang peka.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa & anak - anak dengan berat badan >20 kg :
250 - 500 mg tiap 8 jam

Anak - anak berat badan < 20 kg 20 - 40 mg tiap 8 jam

NIE : GKL 9623404204 A1



KONTRA INDIKASI :

Penderita hipersensitif atau mempunyai riwayat hipersensitif terhadap antibiotik beta laktam.

Sole Distributor :



sam pharindo
putratrading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Amoxicillin

Suspensi Kering 125 mg/5 ml



KOMPOSISI :

Setelah dilarutkan sesuai petunjuk tiap sendok takar 5 ml mengandung :
Amoxicillin Trihidrat 125 mg

Amoxicillin Trihydrate adalah antibiotik golongan penisilin (β -laktam) yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan kematian bakteri.

INDIKASI :

Menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada dismenore primer (nyeri haid) pada penyakit gigi, sakit kepala.

KONTRA INDIKASI :

- Hipersensitivitas terhadap amoxicillin
- Mononukleosis infeksiosa
- Riwayat gangguan hati berat akibat antibiotik ini.

DOSIS :

Dewasa dan anak dengan BB > 20 kg
250-500 mg tiap 8 jam
< 20 kg : 20-40 mg/kg BB tiap 8 jam

KEMASAN :

Botol, @ 60 ml

NIE : GKL 0823411338 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Amoxicillin

Suspensi Kering 250 mg/5 ml



KOMPOSISI :

Setelah dilarutkan sesuai petunjuk tiap sendok takar 5 ml mengandung :
Amoxicillin Trihidrat 250 mg

Amoxicillin Trihydrate adalah antibiotik golongan penisilin (β -laktam) yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri, sehingga menyebabkan kematian bakteri.

INDIKASI :

Menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada dismenore primer (nyeri haid) pada penyakit gigi, sakit kepala.

KONTRA INDIKASI :

- Hipersensitivitas terhadap amoxicillin
- Mononukleosis infeksiosa
- Riwayat gangguan hati berat akibat antibiotik ini.

DOSIS :

Dewasa dan anak dengan BB > 20 kg
250-500 mg tiap 8 jam
< 20 kg : 20-40 mg/kg BB tiap 8 jam

KEMASAN :

Botol, @ 60 ml

NIE : GKL 2423416938 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Antasida Suspensi 5 ml



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar 5 ml mengandung :
Aluminium hydroxide 200 mg
Magnesium hydroxide 200 mg

INDIKASI :

Untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala-gejala seperti mual dan nyeri lambung, nyeri ulu hati.

KONTRA INDIKASI:

- Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan:
- Alergi terhadap salah satu komponen antasida
- Gangguan ginjal berat
- Hipofosfatemia (kadar fosfat rendah dalam darah)

KEMASAN :

Botol, @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa dan Anak > 12 tahun
1–2 sendok takar (5–10 ml) Diminum 3–4 x sehari,
Anak 6–12 tahun
½–1 sendok takar (2,5–5 ml) 3 x sehari atau sesuai anjuran dokter

NIE : GBL 9323403333 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Bisoprolol Fumarate

Tablet Salut Selaput



KOMPOSISI :

Tiap tablet salut selaput mengandung :
5 mg Bisoprolol Fumarate

INDIKASI :

Pengobatan gagal jantung kronis yang stabil dengan penurunan fungsi vertikal kiri sistolik selain inhibitor ACE, dan diuretik, serta glikosida jantung.

- Pengobatan hipertensi
- Pengobatan penyakit jantung koroner

KONTRA INDIKASI :

syok kardiogenik, blok AV derajat kedua atau ketiga, disfungsi nodus sinus, blok sinoatrial, gejala bradikardia, gejala hipotensi, asmabronkial yang parah, bentuk penyakit oklusi parifier yang parah atau sindrom Raynaud.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

- Dewasa : 5 mg Bisoprolol Fumarat 1 x sehari
bila perlu dosis dapat ditingkatkan 10 mg

NIE : GKL 2423417017 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Candesartan Cilexetil

Tablet 16 mg



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

Candesartan cilexetil 16 mg



Candesartan Cilexetil adalah obat yang termasuk dalam golongan angiotensin II receptor blocker (ARB)

KEGUNAAN :

1. Mengobati Hipertensi
2. Mengobati Gagal Jantung kongestif.
3. Melindungi fungsi ginjal pada penderita diabetes

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 4 mg per hari, respon pengobatan 16 mg

NIE : GKL 2423416810 A1

PERHATIAN :

Pada kombinasi Candasartan dan Aliskiren tidak dianjurkan karena ada penggunaan risiko hipotensi, hiperkalemia, dan perubahan fungsi ginjal.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Candesartan Cilexetil

Tablet 8 mg



KOMPOSISI :

Tiap Tablet mengandung :
Candesartan Cilexetil

8 mg

Candesartan Cilexetil adalah obat yang termasuk dalam golongan angiotensin II receptor blocker (ARB)

KEGUNAAN :

1. Mengobati Hipertensi
2. Mengobati Gagal Jantung kongestif.
3. Melindungi fungsi ginjal pada penderita diabetes

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 4 mg per hari, respon pengobatan 16 mg

NIE :

PERHATIAN :

Pada kombinasi Candesartan dan Aliskiren tidak dianjurkan karena ada penggunaan risiko hipotensi, hiperkalemia, dan perubahan fungsi ginjal.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cetirizine Hydrochloride

Tablet Salut Selaput 10 mg



KOMPOSISI :

Tiap Tablet salut mengandung :
Cetirizine hydrochloride 10 mg

Cetirizine Hydrochloride adalah obat antihistamin generasi kedua yang digunakan untuk mengurangi reaksi alergi. Obat ini bekerja dengan cara menghambat histamin yaitu zat kimia dalam tubuh yang memicu gejala alergi.



KEGUNAAN::

Cetirizine digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti : Hidung berair, bersin, dan gatal (rhinitis alergi)Gatal-gatal (urtikaria)Mata gatal dan berair (konjungtivitis alergi)Reaksi alergi kulit ringan lainnya.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 Tablet salut selaput

DOSIS :

Dewasa dan Anak ≥ 12 tahun : 5 mg 2 x sehari | 10 mg 1 x sehari
Anak-anak 6 - 11 tahun : 2.5 mg 2 x sehari | 5 mg 1 x sehari

NIE : GTL 1923415517 A1

PERHATIAN :

Tidak dianjurkan mengemudi atau menjalankan mesin bila menyebabkan kantuk. Tidak dianjurkan kepada pasien gangguan ginjal tau hati dan hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cetirizine Hydrochloride

Sirup 5 mg / 5 ml



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar 5 ml mengandung :
Cetirizine hydrochloride 5 mg / 5 ml

Cetirizine Hydrochloride adalah obat antihistamin generasi kedua yang digunakan untuk mengurangi reaksi alergi. Obat ini bekerja dengan cara menghambat histamin yaitu zat kimia dalam tubuh yang memicu gejala alergi.

KEGUNAAN:

Cetirizine digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti : Hidung berair, bersin, dan gatal (rhinitis alergi) Gatal-gatal (urtikaria) Mata gatal dan berair (konjungtivitis alergi) Reaksi alergi kulit ringan lainnya.

PERHATIAN :

Tidak dianjurkan mengemudi atau menjalankan mesin bila menyebabkan kantuk. Tidak dianjurkan kepada pasien gangguan ginjal tau hati dan hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui.

KEMASAN :

Botol, @ 60 ml

DOSIS :

Dewasa dan Anak ≥ 12 tahun : 5 mg 2 x sehari | 10 mg 1 x sehari
Anak-anak 6 - 11 tahun : 2.5 mg 2 x sehari | 5 mg 1 x sehari

NIE : GTL 1923415737 A1

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate Kaplet Salut Selaput 500 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet salut mengandung :

Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate

500 mg

Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate adalah pertumbuhan dan replikasi DNA bakteri bentuk garam dari ciprofloxacin, yaitu antibiotik dari golongan fluoroquinolone. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim DNA gyrase dan topoisomerase IV pada bakteri, sehingga menghentikan pertumbuhan dan replikasi DNA bakteri.



INDIKASI :

- Infeksi saluran kemih (ISK)
- Infeksi saluran pernapasan
- Infeksi saluran pencernaan
- Infeksi kulit dan jaringan lunak
- Infeksi tulang dan sendi
- Gonorrhea dan Urethritis
- Infeksi intra-abdomen
- Profilaksis dan terapi antraks inhalasi
- Infeksi nosokomial atau multiresisten

KONTRA INDIKASI :

- Resiko tendinitis dan ruptor tendon
- Efek pada sistem saraf pusat
- Efek fotosensitivitas
- Wanita hamil dan menyusui

KEMASAN :

Box, @ 10 strip @ 10 Kaplet salut selaput

NIE : GKL 2223416109 A1

DOSIS :

- Infeksi saluran kemih ringan : 250-500 mg 2x sehari
- Infeksi saluran kemih berat : 500-750 mg 2x sehari
- Infeksi saluran pernapasan : 500-750 mg 2x sehari

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cotrimoxazole Tablet



KOMPOSISI :

Tiap Tablet mengandung :
Sulfamethoxazole 400 mg
Trimethoprim 80 mg

Cotrimoxazole adalah obat antibiotik kombinasi dari Sulfamethoxazole dan Trimethoprim, Cotrimoxazole bekerja sinergis menghambat pembentukan asam folat bakteri, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Digunakan hanya untuk infeksi bakteri.



INDIKASI :

- Infeksi saluran kemih
- Infeksi saluran napas
- Infeksi saluran cerna
- Infeksi THT seperti Otitis media (infeksi telinga tengah)
- Prostatitis, uretritis

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 Tablet

DOSIS :

Tablet 400 mg/80 mg 2 tablet 2 x sehari

NIE : GKL 9223402210 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Cotrimoxazole Suspensi



KOMPOSISI :

Tiap 5 ml suspensi mengandung :
Sulfamethoxazole 200 mg
Trimethoprim 40 mg

Cotrimoxazole adalah obat antibiotik kombinasi dari Sulfamethoxazole dan Trimethoprim, Cotrimoxazole bekerja sinergis menghambat pembentukan asam folat bakteri, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Digunakan hanya untuk infeksi bakteri.

INDIKASI :

- Infeksi saluran kemih
- Infeksi saluran napas
- Infeksi saluran cerna
- Infeksi THT seperti Otitis media
- Prostatitis, uretritis

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang sensitif Sulfanamida atau Trimethoprim
- Bayi usia kurang dari 2 bulan
- Wanita hamil dan menyusui

KEMASAN :

Botol, @ 60 ml

DOSIS :

Tablet 400 mg/80 mg 2 tablet 2 x sehari

NIE : GKL 0423408933 A1

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Dimenhydrinate Tablet 50 mg



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung :
Dimenhydrinate 50 mg

Dimenhydrinate adalah obat dari golongan antihistamin generasi pertama yang digunakan untuk mencegah dan mengobati mabuk perjalanan serta mual, muntah, dan vertigo akibat gangguan telinga bagian dalam.

INDIKASI :

mabuk perjalanan, vertigo, mual dan muntah.

KONTRA INDIKASI :

- Hipersensitivitas terhadap dimenhydrinate atau antihistamin lain
- Pasien dengan porfiria akut (kelainan metabolisme)
- Koma atau depresi sistem saraf pusat berat

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa & Anak ≥ 12 tahun : 50–100 mg setiap 4–6 jam Maksimum : 400 mg/ hari
Anak-anak 6–12 tahun : 25–50 mg setiap 6–8 jam Maksimum : 150 mg/ hari
Anak-anak 2–6 tahun : 12.5–25 mg setiap 6–8 jam Maksimum : 75 mg/ hari

NIE : GTL 2223416010 A1



PERHATIAN :

Dapat menyebabkan kantuk, Efek antikolinergik, pada kondisi Asma, glaukoma, Penyakit jantung atau gangguan hati, Kehamilan dan menyusui.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Domperidone Maleate Tablet 10 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :
Domperidone Maleate

10 mg

INDIKASI :

- Untuk mual-mual akut. Tidak dianjurkan pencegahan rutin pada muntah pasca operasi
- Untuk mual-muntah yang disebabkan pemberian Levodopa & Bromokriptin
- Anak-anak tidak dianjurkan kecuali untuk mual muntah pada kemoterapi kanker & radioterapi

KONTRA INDIKASI :

- Penderita hipersensitif terhadap Domperidone
- Penderita dengan prolaktinoma tumor hipofise yang mengeluarkan prolaktin.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa : 10 - 20 mg 3 x sehari
Anak-anak : Tidak dianjurkan

NIE : GKL 1523413310 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Hydrocortisone Acetate

Krim 2,5 %



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung :
Hydrocortisone Acetate 25 mg

INDIKASI :

Untuk inflamasi non-infeksi pada kulit seperti pada dermatitis atopik, dermatitis kontak, dan reaksi alergi kulit lain yang responsive terhadap kortikosteroid.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang hipersensitif
- Infeksi virus pada kulit
- Tuberkulosis pada kulit

KEMASAN :

Box, Tube @ 5 gram

DOSIS :

Oleskan tipis pada tempat yang sakit 2-4 x sehari

NIE : GKL 1823414429 A1



PERHATIAN :

- Bila terjadi reaksi sensitivitas atau iritasi, obat harus dihentikan.
- Untuk pemakaian luar hindari kontak mata
- Penggunaan topikal hanya sejumlah kecil diabsorpsi, namun hati-hati penggunaan wanita hamil.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Ibuprofen

Suspensi 100mg/5 ml



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar 5 ml mengandung :
Ibuprofen 100 mg

INDIKASI :

Menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada dismenore primer (nyeri haid) pada penyakit gigi, sakit kepala.

KONTRA INDIKASI :

- Alergi terhadap Ibuprofen atau NSAID lain.
- Pasien dengan asthma, rinitis atau urtikaria
- Pasien gagal jantung berat dan gagal ginjal berat.
- Wanita hamil
- anak usia < 6 tahun.

DOSIS :

Untuk meringankan nyeri ringan & demam :
Dewasa : 3-4 x sehari 2 sendok takar
Anak-anak :
1-2 tahun 3-4 x sehari ½ sendok takar
3-7 tahun 3-4 x sehari 1 sendok takar
8-12 tahun 3-4 x sehari 2 sendok takar

KEMASAN :

Botol, @ 60 ml

NIE : GTL 1523413433 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Loperamide Hydrochloridemol

Tablet 2 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :
Loperamide HCl

2 mg



INDIKASI :

Diare akut yang tidak diketahui penyebabnya dan diare kronik.

KONTRA INDIKASI :

- Anak-anak dibawah usia 12 tahun
- Kolitis akut karena dapat menyebabkan megacolon toksik
- Pada keadaan dimana konstipasi harus dihindari
- Penderita yang hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Diare akut : Dosis awal 4 mg setiap buang air besar. Dosis tidak melebihi 16 mg sehari

Diare kronik : Dosis awal 4 mg setiap buang air besar. Dosis tidak melebihi 16 mg sehari

NIE : GKL 2323416610 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Loratadine Kaplet 10 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :
Loratadine 10 mg

Loratadine adalah obat antihistamin generasi kedua yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor histamin di tubuh tanpa menimbulkan kantuk berat seperti antihistamin generasi pertama.



KEGUNAAN::

- Rhinitis alergi, bersin, hidung tersumbat, mata berair
- Urtikaria, gatal-gatal, bintik merah
- Alergi disebabkan debu, makanan atau obat tertentu

KEMASAN :

Box, 10 amplop @ 1 strip @ 10 Kaplet

DOSIS :

Dewasa dan Anak ≥ 12 tahun : 10 mg 1 x sehari
Anak usia 2 - 12 th : BB > 30 kg : 10 mg sehari | < 30 kg 5 mg sehari

NIE : GTL 2423416704 A1

PERHATIAN :

Tidak dianjurkan pada gangguan hati, kehamilan dan menyusui.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Mefenamic Acid Kaplet 500 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :
Mefenamic Acid

500 mg

INDIKASI :

Meredam nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, termasuk karena trauma, nyeri otot dan nyeri sesudah operasi.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang hipersensitif terhadap mefenamic acid.
- Penderita yang dengan asetosal mengalami bronkospasme.
- Penderita dengan tukak lambung dan usus.
- Penderita dengan gangguan ginjal yang berat.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Secara umum dapat digunakan :

Dewasa dan anak-anak > 14 th

Dosis awal : 500 mg, dilanjutkan 250 mg tiap 6 jam sesuai kebutuhan.

Pemakaian obat sebaiknya sesudah makan.

NIE :

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Methylprednisolone Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

Methylprednisolone 8 mg



Methylprednisolone adalah suatu glukokortikoid alamiah memiliki sifat menahan garam, digunakan sebagai terapi pengganti pada defisiensi adrenokortikal.

KEGUNAAN :

Kelainan endokrin, penyakit rheumatik, kolagen, kulit, alergi, penyakit mata, pernafasan, kelainan darah, edema, gangguan saluran pencernaan, syaraf-syaraf.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 4-48 mg per hari, tergantung pada jenis beratnya penyakit serta respon penderita.

NIE : GKL 2223416204 A1

PERHATIAN :

Pemberian obat jangka lama dapat menyebabkan katarak, glaukoma. Pemberian dosis tinggi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah & menurunkan daya tahan tubuh.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Methylprednisolone

Tablet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

Methylprednisolone 4 mg

Methylprednisolone adalah suatu glukokortikoid alamiah memiliki sifat menahan garam, digunakan sebagai terapi pengganti pada defisiensi adrenokortikal.

KEGUNAAN :

Kelainan endokrin, penyakit rheumatik, kolagen, kulit, alergi, penyakit mata, pernafasan, kelainan darah, edema, gangguan saluran pencernaan, syaraf-syaraf.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dosis awal 4-48 mg per hari, tergantung pada jenis beratnya penyakit serta respon penderita.

NIE : GKL 1523413110 A1



PERHATIAN :

Pemberian obat jangka lama dapat menyebabkan katarak, glaukoma. Pemberian dosis tinggi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah & menurunkan daya tahan tubuh.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Miconazole Nitrate

Krim 2 %



KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung :
Miconazole Nitrate 20 mg



INDIKASI :

Infeksi kulit yang disebabkan dermatofit atau ragi, jamur lainnya :

- Pityriasis versicolor (panu)
- Tinea corporis (di leher/badan)
- Tinea cruris (di selangkangan)
- Tinea pedis (di telapak kaki)

KONTRA INDIKASI :

Hipersensitif terhadap Miconazole atau terhadap salah satu komponen obat.

KEMASAN :

Box, Tube @ 10 gram

DOSIS :

Bubuhkan pada lesi 2 x sehari, rataakan dengan jari. Lamanya terapi bervariasi antara 2-6 minggu

NIE : GTL 1823414129 A1

PERHATIAN :

- Bila terjadi reaksi sensitivitas atau iritasi, obat harus dihentikan.
- Tidak boleh kontak dengan mukosa mata.
- Penggunaan topikal hanya sejumlah kecil diabsorpsi, namun hati-hati penggunaan wanita hamil.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Paracetamol

Kaplet 500 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :
Paracetamol

500 mg



INDIKASI :

Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

KONTRA INDIKASI :

Tidak boleh digunakan untuk penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Box, 20 strip @ 10 kaplet

DOSIS :

Dewasa & Anak : > 12 Th : 1-2 kaplet 3 x sehari

Anak : 6-11 th ½ kaplet 3 x sehari

NIE : GBL 2523412804 A1

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Paracetamol

Sirup 120 mg / 5 ml



KOMPOSISI :

Tiap sendok takar 5 ml mengandung :
Paracetamol 120 mg
Alkohol 96 % 1.6 % v/v

INDIKASI :

Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Botol, @ 60 ml

NIE : GBL 9223401937 A1

DOSIS :

Sehari 3-4 kali
0-1 tahun : ½ sendok takar
1-2 tahun : 1 sendok takar (5ml)
2-6 tahun : 1-2 sendok takar
6-9 tahun : 2-3 sendok takar
9-12 tahun : 3-4 sendok takar
atau sesuai petunjuk dokter

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Salbutamol Sulfate Tablet 4 mg



KOMPOSISI :

Tiap Kaplet mengandung :
Salbutamol Sulfate

4 mg

INDIKASI :

Kejang bronkus pada semua jenis asma bronkial,
bronkitis kronis dan emphysema.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitif terhadap obat ini.

KEMASAN :

Box, 10 strip @ 10 tablet

DOSIS :

Dewasa : 2-4 mg tablet 3-4 x sehari

Anak : usia 2-6 tahun 1-2 mg tablet 3-4 x sehari, usia 6-12 tahun 2 mg tablet 3-4 x sehari

NIE : GKL 0623409610 A1



Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Simvastatin

Tablet salut selaput 20 mg



KOMPOSISI :

Tiap tablet salut mengandung :

Simvastatin 20 mg

Simvastatin adalah obat dari golongan statin yang berfungsi untuk Menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida Meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reductase, enzim penting dalam proses pembentukan kolesterol di hati.

KEGUNAAN :

- Menurunkan kadar asam urat dalam darah.
- Mencegah serangan gout (pirai) berulang.
- Mencegah pembentukan batu ginjal dari asam urat.
- Mengurangi hiperurisemia (kadar asam urat tinggi)

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet salut selaput

DOSIS :

Hiperkolesterolemia (primer atau campuran)
10–20 mg 1× sehari malam
Hiperkolesterolemia familial homozigot
40 mg 1× sehari malam
Pencegahan penyakit jantung koroner
20–40 mg 1× sehari malam

NIE : GKL 1923415217 A1



PERHATIAN :

Simvastatin bisa menyebabkan miopati (nyeri otot, lemah) dan dalam kasus berat, rhabdomyolisis (kerusakan otot yang dapat menyebabkan gagal ginjal).

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Simvastatin

Tablet salut selaput 10 mg



KOMPOSISI :

Tiap tablet salut mengandung :

Simvastatin 10 mg

Simvastatin adalah obat dari golongan statin yang berfungsi untuk Menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida Meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reductase, enzim penting dalam proses pembentukan kolesterol di hati.

KEGUNAAN :

- Menurunkan kadar asam urat dalam darah.
- Mencegah serangan gout (pirai) berulang.
- Mencegah pembentukan batu ginjal dari asam urat.
- Mengurangi hiperurisemia (kadar asam urat tinggi)

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 tablet salut selaput

DOSIS :

Hiperkolesterolemia (primer atau campuran)
10–20 mg 1× sehari malam
Hiperkolesterolemia familial homozigot
40 mg 1× sehari malam
Pencegahan penyakit jantung koroner
20–40 mg 1× sehari malam

NIE : GKL 1923415217 B1



PERHATIAN :

Simvastatin bisa menyebabkan miopati (nyeri otot, lemah) dan dalam kasus berat, rhabdomyolisis (kerusakan otot yang dapat menyebabkan gagal ginjal).

Sole Distributor :




sam pharindo
putra trading



PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
sam pharindo perdana
Semarang - Indonesia

Vitamin C 500 mg Kaplet



KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :

Vitamin C 500 mg



Vitamin C 500 mg untuk memelihara kesehatan.

KEGUNAAN :

Suplementasi vitamin untuk membantu memelihara kesehatan tubuh.

KEMASAN :

Box, 10 Strip @ 10 kaplet salut

DOSIS :

1 x sehari 1 kaplet

NIE : POM SD255008141

PERHATIAN :

Bila penderita mengeluh karena gangguan lambung, lebih baik dimulai dengan setengah kaplet sehari sesudah makan.

Sole Distributor :



sam pharindo
putra trading

SOLE DISTRIBUTOR			
	PT. Sampharindo Putra Trading	Jl. Tambak Aji Raya No. 9 Semarang	024-8664227
SUMATERA			
1	PT. Garuda Perkasa Intimedika	Jl. Berjaya No. 88-I-J komplek Cemara Asri, Medan	061-6643815
2	PT. Mestika Sakti	Jl. Veteran No. 64-66-68- 70 Gang Buntu Medan Timur	061-4523118
3	PT. Harapan Raya Mandiri	Jl. H. Imam Munandar No. 400 Rt. 001 Rw. 05 Kel. Tangerang Timur	0761-863313
4	PT. Nareco Lestari	Jl. Lega Sari No. 104. Kec. Bukit Raya Pekanbaru	0761-8403048
5	PT. Belibis Muda Perkasa	Jl. Rambutan No. 16 Kel. 30 Ilir Palembang	0711-319631
6	PT. Talang Gugun Sari Nusantara Padang	Parak Kopi Padang Utara	0751-4481271
7	PT. Nareco Lestari	Jl. Hibrida 15 Kel. No. 107 Sidomulyo Kec. Gading Cempaka- Bengkulu	0736-26903
8	PT. Nareco Lestari	Jl. HM Yusuf Nasri No. 6 RT 22 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi	0741-573613
9	PT. Rosa Nugraha Abadi	Jl. Pulau Pisang LK 1 No. 77 RT. 06 Kel. KORPRI JAYA Kec. Sukarame Bandar Lampung	0721-781219

JAWA DAN BALI			
10	PT. Mitra Berkah Insani	Jl. I Gusti Ngurah Rai Ruko Pondok Kopi No 13 RT. 001 RW. 001 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta	021-21385035
11	PT. Eva Surya Pratama	Jl. Pondasi No. 60 Rawamangun Jakarta Timur - 15210	021-4700888
12	PT. Merapi Utama Pharma	Jl. Cirodari No 23-25 Kel. Cikini Menteng Jakarta	021-3141906
13	PT. Kembang Christa Pharma	Jl. A.H. Nasution No. 137 Karang Pamulang, Kec. Mandalajati, Bandung	022-7203258
14	PT. Sampharindo Putra Trading	Jl. Tambak Aji Raya No. 9 Semarang	024-8664227
15	PT. Safira Daya Mandiri	Jl. Permata Hijau Blok BB No. 29 Semarang	024-3565395
16	PT. Pierosca Terang Sukses Abadi	Jl. Darmo Permai Selatan I/5 Surabaya	031-7340745
17	PT. Sehat Inti Perkasa	Jl. Rambutan Blok D No. 215 RT. 25 RW. 08 Desa Tambak Sumur Kec. Waru, Sidoarjo	031-8688788
18	PT. Intan Surya Prima Abadi	Jl. Bajataki III No. 3 Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat	0361-8947700

KALIMANTAN			
19	PT. Indeksim Beta	Jl. Komplek Tanjung Pura Indah Blok I No. 1-3 Pontianak	0561-749266
20	PT. Sumberindo Farma Tama	Jl. Adisucipto RT. 002/ RW. 001 Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	0561-6710113
21	PT. Surya Borneo Farmalab	Komp. Banjar Indah Permai Jl. Banjar Indah VI No. 10 RT. 25 Banjarmasin	0511-3270526
22	PT. Ferto Mulia Pratama	Jl. MT. Haryono RT. 54 No. 134 Kl. Damai Balikpapan	0542-878086
23	PT. Duaputra Jaya Mandiri	Jl. Graha Indah No. 99 C RT 057	081351884204

SULAWESI			
24	PT. Pinelowan Sulutindo Cemerlang Mandiri	Jl. Makam Imam Bonjol Lota Pineleng Minahasa	0431-7288136
25	PT. Pakuli Farma	Jl. Swadaya No.21 Kel. Tanamodindi, Palu	0451-4021657
26	PT. Sampharindo Putra Trading Cab. Makassar	Jl. Ir. Sutami, Kompleks Pergudangan Parangloe Blok D3 No. 15 Makassar	
27	PT. Astika Mentari Farma	Jl. prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah, No. 33	0411-449138
28	PT. Binaya Jaya	Jl. Pelita Raya Blok A28 No. 7 Karangpuang, Panakkukang, Makassar	0411-434834
29	PT. Sapta Karya Citra Mandiri	Jl. Hertasning Regency No. 15 RT.1 RW.2 Pandang Panakkukang Makassar	0411-885552





SOLE DISTRIBUTOR

sampharindo putra trading

SALES - MARKETING - DISTRIBUTION

Jl. Tambak Aji Raya No. 9 Semarang 50185
Phone (024) 8664227 (hunting) : (024) 8662870 Fax (024) 8660069, 8664838
Email : putratrading@sampharindo.com sampharindo.trading@gmail.com



**Produk berkualitas
Standar CPOB**

ISO 9001:2008



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.